


Medica

Er-Biblioteca



Dr. M. León.

Mexico.



95300

43845/B

ELEMENTOS SUCINTOS

DE FISILOGIA:


ARREGLADOS PARA LOS DISCÍPULOS DE LA ESCUELA ESPECIAL

DEL ARTE DE CURAR DE BARCELONA,

***EN EL AÑO* 1822.**

POR EL DOCTOR D. JUAN RIBOT,

CATEDRÁTICO DE LA MISMA ASIGNATURA.



Barcelona: en la Imprenta de Ignacio Estivill.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library



AMADOS DISCÍPULOS.

De poco os serviría la viva voz del maestro, sino tuvieseis otros datos á que aplicarla. Faltos de libros á que recurrir para cimentaros en los principios fundamentales de la ciencia á que os dedicais, difícil os sería adelantar en la carrera que habeis emprendido; ni aquellos á quienes haya dotado la naturaleza del mayor talento podrían penetrar el verdadero sentido de todos los axiomas que os dictase el profesor en la cátedra. Bajo este supuesto, y deseoso de que no os arredraseis en vuestra empresa, me esforcé el año pasado á proporcionaros las ventajas posibles, publicando unos elementos de patología, obrita primera y única en su clase que se haya visto en nuestro idioma. Ved ahí el motivo porque antepuse la patología á la fisiología.

No os era dado buscar en libros nacionales ideas patológicas arregladas á las luces del día; pero los conocimientos fisiológicos se habían extendido mas, y podiais satisfacer vuestros deseos recurriendo á Richerand, Bichat, Dumas ect., que se hallan vertidos en nuestro idioma. Demasiado grandes son estas obras para un principiante, que antes de estudiarlas, debería estar imbuido en las bases fundamentales de la fisiología.

✓ Con este motivo, y mayormente por el atraso que debeis sufrir en este año habiéndose retardado la apertura de los cursos á causa de la asoladora epidemia que nos ha afligido, no he podido menos de acceder á vuestros ruegos, compendiándoos lo mas sustancial de la fisiología, y presentándoos en este pequeño volumen un bosquejo de lo que debeis aprender antes de dedicaros á ser verdaderos fisiólogos.

Mi deseo no es otro, que proporcionaros las mayores ventajas para que os cimenteis en los principios sólidos de la doctrina, cuya enseñanza está á mi cargo. Compensaréis mis desvelos si merece vuestra acogida este pequeño trabajo.

ELEMENTOS DE FISILOGIA.

La *Fisiología general* es la ciencia natural que tiene por objeto el conocimiento de los fenómenos propios á los cuerpos vivos. Definicion.

Se divide en *Fisiología vegetal* que trata de los vegetales ; *animal* ó *comparada* que trata de los animales ; y *Fisiología humana*, cuyo objeto especial es el hombre. Esta es en la que debemos ocuparnos precisamente. Division.

PRELIMINARES.

Se llama cuerpo todo lo que puede obrar sobre nuestros sentidos. De los cuerpos y sus

Los cuerpos se dividen en *ponderables* é *imponderables*. divisiones.

Los primeros son los que pueden obrar sobre muchos de nuestros sentidos, y cuya existencia es bien manifesta, tales son los sólidos, los líquidos y los gases. Cuerpos ponderables.

Los imponderables son aquellos que en general solo obran sobre un sentido, y que tal vez no son cuerpos sino fuerzas ó modificaciones de los otros cuerpos, tal es el calórico, lumínico, fluidos eléctrico y magnético. Imponderables.

Los cuerpos ponderables son dotados de propiedades comunes ó generales, y de particulares ó secundarias.

Las generales son la estensibilidad, divisibilidad, impenetrabilidad y la movilidad. Todos los cuerpos Propiedades generales.

*les de los
cuerpos.*

*Propieda-
des secun-
darias.*

*Estados de
los cuerpos.*

*Cambio de
estado.*

*Composicion
de los cuer-
pos.*

Simples..

Compuestos.

sin escepcion gozan estas propiedades reunidas.

Las secundarias no comprenden todos los cuerpos, y son la dureza, porosidad, elasticidad, fluidez etc.; estas en union con las generales, constituyen el estado de los cuerpos, de manera que adquiriendo ó perdiendo estas propiedades secundarias los cuerpos cambian de estado; por egemplo, el agua puede pasar al estado de hielo, de líquido y de vapor, resultando siempre un cuerpo el mismo, con solo adquirir ó perder alguna de sus propiedades secundarias.

Los cuerpos son simples ó compuestos. Los primeros con dificultad se encuentran en la naturaleza, son casi siempre el producto del arte y se llaman simples solo porque el arte no ha podido descomponerles. En el dia se tienen por simples los siguientes: oxígeno, cloro, yodo, fluore, azufre, hidrógeno, boro, carbono, fósforo, azoe, silicio, circonio, aluminio, itrio, glucinio, magnesio, calcio, stroncio, bario, sodio, potasio, manganeso, zinc, fierro, estaño, arsénico, molibdeno, cromo, tungsteno, columbio, antimonio, uranio, cerio, cobalto, estaño, bismuto, cobre, telluro, niquel, plomo, mercurio, osmio, plata, rodio, paladio, oro, platina é iridio con algunos mas.

Los compuestos se encuentran por todas partes; forman la masa del globo y la de todos los seres que ocupan su superficie. Ciertos cuerpos gozan de una composicion constante, de modo que solo puede cambiar por circunstancias casuales; al contrario hay otros cuya composicion cambia á cada instante.

Esta division de los cuerpos es muy importante porque de ella resulta naturalmente la diferencia de los cuerpos en dos clases: aquellos cuya composicion es constante se llaman cuerpos *brutos*, *inertes* ó *inorgánicos*; y aquellos cuyos elementos varian continuamente se conocen con el nombre de cuerpos *organi-*

zados ó vivos.

Los cuerpos brutos y los vivos se diferencian entre si por su forma ó figura, composicion, leyes que presiden los cambios de estado, formacion y destruccion.

Tabla de las diferencias entre cuerpos organizados é inorgánicos.

Cuerpos brutos.

Cuerpos organizados.

Forma.

Forma angular.

Redondeada.

Volúmen indeterminado.

Volúmen determinado.

Composicion.

Algunas veces simples

Jamas simples.

Raramente formados de mas de tres elementos.

A lo menos cuatro elementos: á menudo ocho ó diez.

Constantes.

Variables.

Cada parte puede existir independiente de las otras.

Cada parte es dependiente mas ó menos del todo.

Pueden ser descompuestos y recompuestos.

Pueden ser descompuestos, pero no recompuestos.

Leyes que los rigen.

Sometidos enteramente á la atraccion y afinidad química.

En parte sometidos á la atraccion y afinidad química, y en parte á leyes desconocidas.

Formacion ú origen.

No dependen de otros iguales.

Dependen de otros iguales.

Suelen formarse por descomposicion de otros.

Para su formacion no se sigue la destruccion de otros.

Nacen de reunion de principios por afinidad química.
Crecen por *juxta posicion*.

Nacen por generacion.

Crecen por *intussuscepcion*.

Destruccion.

Se destruyen por afinidad *divellente* de otros cuerpos vecinos.

Se destruyen por una verdadera muerte.

Los cuerpos vivos se dividen en vegetales y animales.

Vegetales.

Animales.

Diferencias.

Son fijos.

Tienen el carbón por base principal.

Compuestos de cuatro ó cinco principios.

Reciben y encuentran preparado el alimento á su alrededor.

Nútrense principalmente por las raíces.

Se mueven sobre la tierra.

Tienen el azoe por base.

A menudo compuestos de ocho ó diez principios.

Tienen necesidad de un aparato particular destinado á preparar los alimentos y volverlos aptos para su nutricion.

Nútrense principalmente por la boca.

Elementos animales.

Elementos que entran en la composicion de los animales.

Son sólidos, líquidos, gaseosos é incoercibles.

Sólidos: fósforo, azufre, carbon, hierro, manganesa, potasa, cal, sosa, magnesia, sílice y alumine.

Líquidos: ácido muriático y el agua que forma las tres cuartas partes de la organizacion cuando considerada como elemento animal.

Gasosos : oxígeno , hidrógeno , azoe.

Incoercibles : calórico , lumínico y los fluidos eléctricos y magnético.

Estos elementos conbinados entre sí de diferentes maneras forman los *principios inmediatos de los animales*. *Principios o materiales inmediatos de los animales.*

Los materiales inmediatos de los animales son divididos en azootizados y no azootizados.

Los azootizados son; la albumina, la fibrina, la gelatina, el moco, el queso la urea, el ácido urico, litico y el principio colorante de la sangre.

Los no azootizados son: el ácido acético, el ácido formico, el ácido benzoico, el ácido lactico, el ácido oxalico, el ácido rosacico, el azúcar de leche, el azúcar del diabetes, el picromiel, el principio colorante amarillo de la bilis, y de los demas líquidos y sólidos que vuelven amarillos accidentalmente, el principio vesicante de las cantharidas, el esperma de ballena, el cálculo viliar, el principio odorífero del ambar, del moscho, del castor, ect. que apenas son conocidos mas que por el olfato.

Las grasas animales no son simples, la humana, la de puerco y la de carnero se componen principalmente de dos cuerpos grasientos muy diferentes.

No debe contarse entre estos principios ni confundirse la materia adiposa que se halla en los cadáveres despues de mucho tiempo de sér enterrados, con la esperma de ballena y el cálculo viliar.

La manteca de baca no es cuerpo simple; contiene ácido acetico un principio colorante amarillo y un principio odorífero que se manifiesta en los quesos.

Estos materiales se conbinan entre si de diferentes maneras y de su conbinacion nacen los elementos organicos que son solidos y liquidos. Se ignoran las leyes que presiden á estas conbinaciones.

Elementos organicos.

Los sólidos se presentan bajo la forma de canales, laminas y membranas. El peso total de los solidos del

cuerpo humano es ocho ó nueve veces menor que el de los líquidos, sin embargo esta proporción varía por diferentes circunstancias.

Qualquiera que sea la forma de los sólidos se ven siempre formados de fibras de alguno ó algunos de los diez tejidos ó sistemas divididos en.

| | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Tejidos. | Celular..... | |
| | Vascular..... | { arterial. |
| | | { venoso. |
| | | { linfático. |
| | Nervioso..... | { cerebral. |
| | | { ganglioso. |
| | Oseo..... | |
| | Fibroso..... | { fibroso. |
| | | { fibro-cartilaginoso. |
| | | { dermoideo. |
| | Muscular..... | { voluntario. |
| | | { involuntario. |
| | Erectil..... | |
| | Mucoso..... | |
| | Seroso..... | |
| | Corneo ó epidérmico.... | { piloso. |
| | | { epidermoideo. |
| | Parenquimatoso | [glandular. |

Asociandose estos sistemas entre si y con los fluidos componen los órganos ó instrumentos de la vida.

Que son órgano y aparato.

Quando muchos órganos tienden por su acción á un mismo fin comun se llama su reunion *aparato*: el numero de aparatos y su disposición establecen las diferencias de los animales.

Los tejidos de que se componen los órganos gozan

de propiedades químicas y físicas, propiedades que conviene estudiarlas en el cadaver y en el vivo. Tienen á poca diferencia las mismas propiedades físicas que los cuerpos inertes, como por ejemplo los diferentes grados de consistencia desde una grande dureza hasta la de líquidos, la elasticidad, transparencia &c: pero á mas gozan los tejidos orgánicos ciertas propiedades particulares que llamamos *propiedades del tejido*. Estas son la sensibilidad y contractilidad del tejido, y la contractilidad por encogimiento. *Propiedades del tejido.*

Los tejidos por razon á su composicion se han considerado los unos principalmente compuestos de gelatina, otros de albumina, otros de fosfate de cal, otros de fibrina &c., sin embargo este estudio es muy neccsacto. *Propiedades químicas.*

Amas los tejidos gozan de propiedades dependientes de la vida: tales la sensibilidad y contractilidad. *Propiedades animales.*

La anatomia general es la ciencia cuyo objeto es el conocimiento de las propiedades del tejido bajo los tres diferentes respectos de propiedades físicas, químicas y vitales.

De los fluidos ó humores.

Los humores de los animales y principalmente el cuerpo del hombre son muy considerables relativamente á los sólidos. Son á veces contenidos dentro los vasos donde caminan con mas ó menos rapidéz ó lentitud, ó dentro celdillas como esparrados y como en deposito, ó se detienen estancados dentro las grandes cavidades por mas ó menos tiempo.

Los fluidos del cuerpo del hombre son:

- 1.^o La sangre.
- 2.^o La linpha.
- 3.^o Los humores prespiratorios que comprenden los humores de la transpiracion de las membranas

Fluidos humanos.

mucosas, serosas sinoviales, del tejido celular, células grasosas, membranas medulares, del interior de la tiroides del timo. &c.

4.^o Los foliculares: el humor grasiento de la piel, el cerumen, la lagaña, el moco de las glándulas y folículos mucosos de las amígdalas, de las glándulas del cardias, del alrededor del ano, de la postata. etc.

5.^o Los fluidos glandulares: las lágrimas, la saliva, el humor pancreático, la bilis, la orina, el fluido de las glándulas de Couper, el esperma, la leche, el líquido contenido en las glándulas suprarrenales, el de los testículos, y de la masma de los recién nacidos.

6.^o El del quilo.

No es fácil clasificar exactamente los humores: con todo puede decirse que el quilo convertido en sangre es la fuente principal de ellos y que si bien de alguno como la leche se duda nazca inmediatamente de aquel humor, es á lo menos indudable pende de él en gran parte. La linfa ó humor contenida en el sistema linfático siendo como es el eciduo de las secreciones que lleva en disolución mezcla, ó combinación otras sustancias unidas á ella en su curso, es evidente que no es humor manantial, antes bien nacido del primero. Todos los demás humores son segregados de la sangre mediante la acción de algún órgano.

Causas de los fenómenos propios de los cuerpos vivos.

Principio vital. El principio vital es el agente único que excita y preside los fenómenos vitales. No debe abusarse de esta voz considerando al principio vital como una causa material pues él indica una causa desconocida y nosotros le atribuiremos la significación de la reunión de las propiedades vitales.

Estas son : 1.a La sensibilidad orgánica , vegetativa , nutritiva ó molecular; propiedad inherente á cada una de las partes del cuerpo vivo por la que se resiente exclusivamente del estímulo que le induce la materia nutritiva que trascola en su interior para asimilarse. El otro es resentirse del material que pasa por el interior de su cavidad para recibir alguna modificación correspondiente para poder escitar el órgano inmediato. Esta y la contractilidad orgánica son indispensables de modo que las goza cada una de todas las partes vivas desde las del mas sencillo vegetal al animal mas complicado; sin embargo estas propiedades son diferentemente modificadas en cada viviente y en cada parte de las que le componen, de modo que no solo dista la escitabilidad en un ser variado, si aun en cada órgano de un mismo ser: asi es que el estímulo de la sabia que escita debidamente un órgano, deja de escitar otro inmediato si antes no ha sido perfeccionado en el órgano anterior que atrabiesa.

*Propiedades
vitales*

2.a La contractilidad orgánica insensible , nutritiva ó fibrillar: por ella los solidos escitados se mueven y procuran insensiblemente el paso á lo contenido al órgano inmediato, atenuandolo ó conviniendolo mejor y modificandolo; tambien por ella se apropia el material que debe reemplazar las pérdidas continuas asimilandolo á su propia sustancia. Las precedentes son indispensables para la vida de todos y constituyen la vida orgánica: por ellas se resisten á los agentes contrarios á su conservación rechazandolos, se resiste al calor, al frio, en una palabra forman la resistencia vital, la situacion fija, la caloricidad etc.

3.a Contractilidad orgánica sensible, irritabilidad, movimiento vermicular; es por esta que las partes que la gozan como los intestinos y el cuerpo de algunos réptiles se alargan y encogen sensible y espontaneamente: el movimiento del corazon es mas bien animal invo-

luntario sensible que orgánico insensible: esta contráctilidad está en razon directa de la antecedente.

4.a Sensibilidad cerebral, animal, perceptiva, de relacion etc; por esta propiedad se resienten con conciencia los órganos dotados de ella de las impresiones de los agentes exteriores. Es exclusiva á los animales dotados de cerebro y nervios ó suplentes de nervios: así es que los vegetales y animales colocados en los primeros eslavones de la escala animal son destituidos de esta propiedad viviendo solo con la vida orgánica.

Se divide en general que corresponde á todos los órganos con nervios, y particular solo perteneciente á determinados que se resienten de estímulos exclusivos: tal la vista de los rayos luminosos, el oído de los sonoros, el olfato de las partículas odoríferas, el gusto de los sabores y el tacto de las cualidades tangibles de los cuerpos. Estos son los sentidos externos.

5.a Contractilidad nerviosa, voluntaria, sensible, animal, de relacion, muscular &c. Esta lo mismo que la antecedente es exclusiva de los nervios, siendo solo propia del tegido fibroso-muscular.

6.a Contractilidad nerviosa, sensible, involuntaria: tal es la del corazón escitable por el fluido eléctrico etc.

La sensibilidad animal y las contractilidades nerviosas solo convienen á los animales cuyos fenómenos son multiplicados hasta tener necesidad para su natural existencia de establecer relaciones con los seres que les rodean. Forman la vida animal ó de relacion. La esquisitez en la sensibilidad animal es en razon inversa de la orgánica.

Fenómenos de la vida de los fluidos.

Es indudable que los humores mientras circulan por los vasos vivos conservan ciertos caracteres específicos, á la manera que los sólidos vivos sus propie-

dales, y que como estos no se reintegran, cuando han llegado á perderlas, por haberse estraído del cuerpo á que pertenecian.

Los fenómenos constantes oriundos de ellos no *Fenómenos* permiten dudar de la existencia de propiedades vi- *vitales.* tales en los fluidos. La fluidéz característica mientras se conservan dentro de los respectivos vasos del cuerpo vivo, el modo con que algunos se organizan poco despues de ser estraídos, la facultad de producir el calor, el olor específico inimitable que exalan &c. son los principales fenómenos que obligan á creer que los líquidos gozan de vida.

Resultados del organismo.

Estos son: 1.º evadirse los órganos de lo desprendido de ellos por no poder servir mas á su formación, y la asimilacion de las sustancias que deben reemplazar á las primeras mediante la accion vital: para explicar esto, es preciso confesar á cada parte viva cierta afinidad ó atraccion vital por la que elija de la sangre ó material nutritivo los principios que le corresponden dejando los que no le son propios; 2.º una fuerza repelente por cuya se sacuda de las moléculas desprendidas del órgano por la accion vital; 3.º una fuerza de atraccion vital particular á las embocaduras de los vasos absorventes esparcidos en lo interior de los órganos; 4.º una ley de asimilacion por la que cada parte solidifique, convine y transforme á su propia sustancia el material elegido.

En esto consiste la nutricion que es el fin directo de la vida. Sea cual fuere el cuerpo que vive le es indispensable el organismo que es lo mismo que decir, estar formado de justa proporcion respectiva de sólidos y líquidos dotados unos y otros de sus propiedades características.

Podríamos haber omitido este capítulo si consideramos que la vida es propiamente lo mismo que el organismo ó la acción de ciertas propiedades inherentes á una clase de cuerpos compuestos de sólidos y fluidos en proporción respectiva; con todo para hacer mas comprensible este punto sobre quien versan todas las partes de la medicina parece del caso gastar con ello algunos momentos ampliando el significado de esta voz, con cuyo medio único se advierte la diferencia de los cuerpos vivos entre si.

Vida orgánica.

Hablando de las propiedades del tejido hemos dicho que gozaba este á mas de las físicas y químicas otras particulares llamadas vitales diferentes en cada ser vivo y en cada parte del mismo, y que le sujetan á un modo de existir independiente hasta cierto punto de las leyes generales de la materia inerte. Ellas son la sensibilidad y contractilidad orgánica. De ellas resultan la calorciidad, resistencia vital ect. y de sus modificaciones las diferencias vitales, porque por su influjo son diferentes los principios de cada órgano asimiliados y conuinados sin ser afines ni conuinables por el arte. Esta es la vida orgánica que comprende desde el mas sencillo vegetal al animal mas sublime.

A mas algunos seres vivos exigen para su existencia establecer mas ó menos relaciones con los externos, tanto mas cuanto mas complicado es su organismo. Estos son la mayor parte de los animales á escepcion de los zoófitos y los colocados en los primeros eslabones de la escala animal quienes mas parecen plantas que animales.

Todos los que necesitan tener estas relaciones exigen un sistema particular de órganos que es el nervioso, cuyo desenvolvimiento, estension y esquisidez es relativa al número y necesidad de relaciones. Asi

el hombre á quien le son tan indispensables , tiene un sistema nervioso el mas dilatado , el mas perspicaz; el lugar de percepcion (cerebro) incomparablemente mayor , y dotado de mayor energía de propiedades. En aquellos animales que provistos de nervios , exigen pocas relaciones apenas se conoce intimidad entre este sistema y la vida orgánica , de modo que parecen independientes uno de otro ; pero á medida que vamos subiendo á animales de mayor complicacion vemos crecer la necesidad de obrar ambos mas acordes y dependientes reciprocamente , hasta que llegando al hombre les vemos tan enlazados que hasta la vida de los órganos relativos está sujeta á la influencia nerviosa. Esta es la vida animal compuesta de la sensibilidad y contractilidad cerebrales ó nerviosas. *Vida animal*

En los cuerpos vivos se nota una dependencia tanto mayor cuanto mas esencial es el órgano. Esta dependencia es relativa á la complicacion del organismo y la llamamos *simpatia*.

Simpatias.

Son la correspondencia que tienen los órganos entre sí. Muchos se corresponden mutuamente ; pero los hay cuya correspondencia no es recíproca , de manera que el uno obra siendo otro escitado sin que este se mueva irritado aquel.

Al paso que las simpatías son mas evidentes en el estado morbozo que en el sano , son en este mas constantes. Las simpatías son de vida orgánica ó animal: las primeras son muy numerosas pero poco manifestas solo en el estado morbozo se hacen conocer porque de ellas resultan las sinergias ó concurso de fuerzas de vida sobre un punto escitado ; las segundas son tambien bastante numerosas y las mas de ellas muy sensibles. Las orgánicas se efectuan sin órgano inter-

medio ó instrumento conocido, porque tampoco lo es el de las propiedades de esta vida de la que dependen. Las nervisosas son conocidas, pero no el orden que guardan en los mas de los casos.

Division.

Las simpatías son generales y particulares; las primeras se efectúan por la acción de los órganos esenciales como cerebro, corazón, estómago é intestinos, cuyas funciones son enlazadas entre si y de ellas dependen inmediatamente las de todos los demas.

En la edad de puertad se desenvuelven las simpatías entre los órganos de la generacion y el larium, y en las mugeres á mas entre aquellos y las mamas, constituyendose el útero en esta edad un nuevo foco de donde parten innumerables simpatías con el resto de la economía.

Paticulares.

Se llaman simpatías particulares cuando dos órganos se influyen reciprocamente sin que los otros tomen parte activa en ello. Pueden ser de cuatro especies: 1.^a Las de dos órganos simétricos entre si, v. g. las dos pupilas.

2.^a Las de dos órganos de funcion análoga que se suplen mutuamente v. g. el útero y las mamas, los riñones y la piel.

3.^a Las de órganos continuos v. g. el glándula y la vejiga; y contiguos v. g. la vejiga urinaria y el intestino recto.

4.^a Las de los órganos sin relacion anatómica conocida v. g. los de la generacion y el larium, los musculos del abdomen y diafragma con el recto. Las de esta especie son mas comunes en el estado patológico.

En el hombre sano todas las simpatias evidentes parecen ser debidas á la influencia nerviosa ó cerebral.

Las simpatias son indispensables para el feliz ejercicio de las funciones: á su beneficio los órganos se prestan mutuamente los socorros activos; así es que

en el acto de la digestion estomacal todas las partes del cuerpo concurren á esta funcion, en una palabra, puede decirse que todas las partes del cuerpo viviente tienen la facultad de transmitirse mutuamente las impresiones: sin embargo las mas lo hacen siempre y es notorio el consenso; á estas llamamos *simpatías directas*, en y otras se verifica solo en ciertos casos sin ser uniforme el modo de manifestarse; estas toman el nombre de *indirectas ó anómalas*.

Existen en la economía animal independientes del cerebro diferentes centros de sensibilidad en donde parece que esta propiedad es mas exaltada y en donde las impresiones se concentran para transmitirse á las demas partes. Estos focos son en el epigastrio, en el pecho, y en los órganos de la generacion. En efecto la mayor parte de las revoluciones manifiestan su origen ó centro de comunicacion en alguno de estos puntos como si cada uno de ellos fuera un depósito de principio sensible y motor con facultad de distribuirlo á los demas órganos aumentando, disminuyendo, anulando ó pervertiendo sus funciones.

De estos mismos focos de concentracion de propiedades vitales parece dependen tambien los *movimientos de expansion* fuerza desde el centro á la circunferencia, y *concentracion* de la circunferencia al centro. Del arreglo é igualdad de estos dos movimientos depende la salud.

Movimientos de expansion y concentracion.

Salud.

La salud pues consiste en la justa balanza de los movimientos de accion y reaccion.

En el movimiento de expansion los órganos se dilatan y en el de concentracion hay una verdadera constriccion. Ambos movimientos se efectuan en el todo del cuerpo y en cada órgano en particular.

Si del todo no dependen del sistema cerebral, alomenos las influencias de sensibilidad general é intelectual modifican de un modo evidente estas fuerzas: por

ejemplo, el placer determina la expansion; el dolor, temor y pasiones tristes la concentracion. Tambien influye la edad, el genero de vida y el uso de las cosas con-naturales.

Por la edad.

En la infancia predomina la expansion; parece que en esta edad todas las partes se hallan animadas y experimentan un mayor desarrollo á favor de este movimiento. Al contrario la concentracion predomina en los viejos.

Estacion.

En verano y paises calientes es mayor la expansion y en invierno y paises frios la concentracion. En los primeros el calor espase las fuerzas provocandolas á la piel, resultando este órgano capaz de una accion mas viva.

En el otoño se experimentan rápidas alternativas que dan origen á trastornos por falta de habito, lo mismo que sucede en la primavera, con la diferencia que en esta estacion es algo preponderante la concentracion y al contrario en otoño es mayor la expansion; con todo en otoños húmedos el peso de la atmósfera cargando sobre la piel impide en gran parte el agolpamiento de fuerzas en este órgano sucediendo de aqui la concentracion.

La vida sedentaria, el poco ejercicio, el uso de alimentos flojos, los oficios en que los hombres deben permanecer por mucho tiempo con los pies en immersion y el habitar en recintos poco ventilados, pantanosos, de aguas flojas ect. procuran la concentracion impidiendo la evaporacion del cuerpo.

*Simpatías
por mitad
del cuerpo.*

Los órganos colocados en la misma mitad leteral del cuerpo de los animales principalmente del hombre guardan constantemente entre si ciertas relaciones, aunque mas evidentes en el estado enfermo que en el sano. Por razon de estas relaciones parece que el cuerpo se halla dividido en dos mitades verticales perfectamente semejantes, una derecha y otra izquierda, de

modo que ciertos órganos se sirven mutuamente de contrapeso para mantener el equilibrio entre las dos mitades, y que á la falta de esta cimetría es indefectible el desórden.

Hábito.

No es facil definir el hábito, pero diremos con Richerand que consiste en la reiteracion de ciertos actos ó movimientos á que obedecen algunas partes del cuerpo.

En que consiste.

A la verdad el efecto principal del hábito es embotar la sensibilidad de los órganos volviéndolos poco á poco insensibles á los estímulos que al principio mas les escitan; por esta razon lo agradable, por el hábito se vuelve indiferente, de que resulta la inconstancia; y tambien lo ingrato por lo mismo se nos hace tolerable: asi es que la muerte puede mirarse como una consecuencia natural de las leyes del hábito porque los órganos que al principio se mueven bien á favor del estímulo físico, van perdiendo sucesivamente la escitabilidad hasta mostrarse del todo insensibles.

Efecto principal del hábito.

Inconstancia.

El conocimiento del habito para el uso de las cosas connaturales es de sumo interes por el influjo que tiene en la accion de los órganos, de modo que los hombres por la costumbre unos viven sanos con lo que seria veneno para otros y *viceversa*: por esto es menester grande circunspeccion en apartarles de lo acostumbrado, exigiendo cuando nos veamos obligados á ello, que lo efectuen lentamente, y sin perderlos de vista para oponernos á los malos resultados que podrian suceder de la suspension de lo acostumbrado. La matriz está muy sujeta á la influencia del habito; por esto hay mucha dificultad en reintegrarla cuando se halla habituada á un desórden.

Poder del hábito.

Influjo del mismo.

El estudio sobre el conocimiento del hábito es de sumo interes en la práctica de la medicina, porque sus leyes influyen mucho para la invasion, curso, progresos y terminacion de las enfermedades, é ilustran sobremanera en la aplicacion de los remedios que solo cooperan á la curacion modificando la sensibilidad.

Embota la sensibilidad y perfecciona el juicio.

Es importante saber que la mucha repiticiou de unos mismos actos embota constantemente la sensibilidad general nerviosa, del mismo modo que la orgánica, al paso que perfecciona el juicio; asi que el aficionado á la música, despues de mucho tiempo, al paso que oye menos, conoce mejor los tonos y la armonia. Cuando la sensibilidad de los sentidos externos se halla embotada por el continuo uso de unos mismos estímulos, la suspension de estos y suplirles con otros reintegran en mucho el sentido. El movimiento voluntario se perfecciona con el hábito.

De las circunstaneias individuales.

Estas son la edad, sexo, temperamento, idiosincracia, modo de vivir y moral individual.

Edad.

En la edad se comprende todo el período de la vida, durante esta experimenta diferentes variaciones, en cada una de las cuales parece ser el hombre un ser diferente, porque en efecto variando en lo físico y en lo moral pasa en la sociedad á un hombre á otro. Pasa tambien lentamente desde su formacion de una vida imperfecta á otro estado en que disfruta la mas perfecta de las conocidas. Aqui no haremos mas que anotar los períodos en general dejando el pormenor de diferencias con respecto á las funciones para cuando se trate de cada una de estas en particular.

Division.

Dividiremos la edad en embrion ó feto, infancia, pubertad, edad viril, vejez y decrepitud. Algunos

días despues de la concepcion se distingue en el útero una vegiguilla membranosa llena de una jaléa líquida y trémula sin apariencia de organizacion y de vida. Este huevo va tomando incremento y consistencia, se disminuye su transparencia y se distinguen ya las primeras delineaciones de las partes y un bosquejo de la cabeza del tronco y de las estremidades. La vegiga se adiere al útero y su superficie esterna se pone marchita y vellosa siendo la union mas manifesta en el punto en que debe implantarse le placenta. Durante este tiempo parece que solo ha vivido por mera absorcion. Hacia los diez y siete dias empieza un punto rojo á manifestar el sitio del corazon, no advirtiéndose las demas partes no obstante de que todas las que deben componerle se forman á un mismo tiempo. El no presentarse pues á la vista como el corazon es por no ser adecuadas para reflejar la luz por la naturaleza de su organizacion. En fin todo se va opacando, y se aísla un cuerpo con quien puede juzgarse la figura del feto. Se desarrolla y crece con una rapidez mucho mayor comparativamente que en lo restante de la vida. Unido ya el feto con la madre por la comunicacion del cordon, recibe de esta mayor influjo, y ya no es la vegetacion por sola absorcion. A proporcion que incrementa se desarrollan y se hacen sensibles los órganos de los sentidos. Continua con incremento rápido hasta el nacimiento siendo su ecsistencia puramente vegetativa, pues á modo de parasita todo lo absorve preparado de la madre sin que en nada trabaje el su alimento.

Nace el feto á los nueve meses de estar encerrado en el útero y aqui empieza la infancia en que *Infancia.* deben ya trabajar sus órganos asimilativos; ya no vive tanto á expensas de su madre, ni le es como antes indispensable.

La epidermis del recién nacido se engruesa, disminuye la rubicundez de su piel y se le cae el bello. En los primeros tiempos de su vida parece no haber mas cuidados que mamar y dormir, no obstante cuando empieza el entendimiento á desarrollarse mira con atencion los objetos. Al principio sujeto á sensaciones penosas que espresa llorando de continuo, despues se hace su ecsistencia menos dolorosa á medida que se va acostumbrando á las impresiones. Hacia la mitad del segundo mes, ya se presta á sensaciones agradables, que acredita riéndose.

Denticion.

A fines del séptimo mes empiezan á salir los primeros incisivos del medio de la mandibula superior, poco tiempo despues los correspondientes de la inferior, despues los incisivos laterales de una y otra, en seguida los molares primero los superiores. Desde los diez y ocho meses á los dos años salen los pequeños molares con un orden inverso al de los antecedentes; primero los de la mandibula inferior que de la superior, y con esto concluye la primera denticion. A los cuatro años aparecen dos molares en cada mandibula. Estos últimos forman las primeras muelas gruesas que quedan para toda la vida, en lugar que los primeros llamados dientes de leche se mudan á los siete años guardando el mismo orden que para salir. Hacia los nueve años nacen otros dos molares gruesos. A esta época tiene veinte y ocho dientes y está completa la dentadura, aunque desde los diez y ocho á los treinta años salen las dos muelas tardias ó del juicio. El germen de los dientes parece ser una vegiguilla celular cuyas celdillas se llenan de una tierra calcarea que constituye su dureza.

Tambien se van endureciendo todas las demas partes del esqueleto, se descubren los huesos cortos y todos adquieren su proporcionada figura y separacion. A este desarrollo llamamos osificacion. Se osifican los

Osificacion.

huesos planos del craneo, se tropiezan por sus bordes, sus hebras se entrecruzan, forman las suturas y desaparecen las fontanelas. Las orinas contienen poco fosfato de cal porque en esta época se emplea para la osificación. Al año y medio han adquirido ya los huesos largos la consistencia y firmeza suficientes para sostener el peso del cuerpo y la criatura puede mantenerse en pie. Antes de este tiempo seria perjudicial el procurarlo porque por el peso del cuerpo se doblarian los huesos entonces muy flexibles.

En los niños las fuerzas de la vida se hallan agolpadas hácia la cabeza; por este medio se explica la razon de la mayor propension á padecer enfermedades de cabeza en esta edad. En la primera infancia reciben con facilidad toda suerte de impresiones, pero son menos estables y poco duraderas.

El sexo, el clima y el género de vida tienen grande influjo sobre el descubrimiento mas ó menos *Pubertud.* acelerado de los fenómenos de la pubertad. La muger llega un año ó dos antes que el hombre. En los climas calientes mucho antes que en los frios, en estos comparece la menstruacion dos ó tres años mas tarde. En la pubertud, que empieza en los hombres á los quince años y en las mugeres á los trece, se desarrolla el sexo, siendo esta la señal característica de la pubertad. En ambos pues se desarrolla sus partes genitales que hasta entonces no *Se desarro-* tenian uso; pero luego se segrega en el hombre el *lla el sexo;* semen, su voz se hace mas grave y sonora, y la *característi-* barba se le cubre de pelo: en la muger se desar- *ca de la pu-* rolla el útero, amanece la menstruacion y se abultan los pechos. En ambos sexos entran los deseos venereos y parece que la mutacion fisica transcien- *bertad.* de hasta la moral, de modo que las funciones intelectuales, sobre todo el juicio adquiere con prontitud una estension considerable, aborrocen los jue-

gos pueriles y son conducidos naturalmente al desempeño de un papel mas serio en la sociedad.

Edad viril.

Sigue á la puertad la edad viril que entra sobre los veinte y cinco años, tiempo en que deja de crecer el cuerpo en alto y sus órganos se hallan en el estado de mayor perfeccion de que son susceptibles. Las facultades intelectuales y morales se hallan en estado que le constituyen capaz de llenar los deberes de hombre social. En esta edad tambien el temperamento se halla enteramente desenvuelto.

Continua hasta los cuarenta y cinco ó cincuenta años, entre tanto crece el cuerpo en anchura y pierde sucesivamente las fuerzas.

Edad de decrecimiento.

El decremento no es mas rapido que el incremento sino que sigue con poca diferencia una misma marcha. Entra pues el hombre en la vejez despues de cuarenta años poco mas ó menos de aumento. De lo dicho se infiere que la duracion de la vida puede medirse por la de incremento.

Luego el cuerpo se disminuye, el tejido celular se marchita, la piel sobre todo de la frente y rostro se arruga, los cabellos y pelo se vuelven blancos, la accion orgánica se pone lánguida, los humores se disponen á la putrefaccion y las facultades intelectuales disminuyen sucesivamente hasta que llegando á los setenta se ha-

Edad decrepita.

llan casi abolidas; aqui comienza la edad caduca ó decrepita que supone los órganos poco sensibles; ya no siente debidamente el hombre la impresion de los cuerpos que le rodean y se deja llevar de lo que le sugieren sus juicios falsos; ya es lento en sus acciones é imposibilitado en sus movimientos; se le caen los dientes y pelo, se osifican sus ternillas, los huesos forman vegetaciones irregulares y se sueldan unos con otros, en fin todo se seca y acorta, sobre todo el calor animal se rebaja porque falta la energía pulmonar no menos que de los demas órganos donde debian efectuarse las convina-

ciones que lo desprendian. El cuerpo se pone corbado, la estatura disminuye á consecuencia de deprimirse con el peso del cuerpo las láminas fibroso-cartilaginosas de union del cuerpo de las vertebrae, al mismo tiempo que se secan por la falta de jugos; los músculos erectores del tronco debilitados no pueden impedir ya que el tronco se incline hacia delante do tiende naturalmente.

Por último el hombre es conducido por grados á la *Muerte natural*, solo porque la vida se debilita por esta-

dos sucesivos, siendo la muerte el último término de esta sucesion graduada y natural.

Empieza la inaccion por los capilares, cunde por los ramos, pasa á los troncos, vasos mayores y corazon en cuyas cavidades derechas se acumula la sangre en el acto de la muerte, porque la respiracion se suspende despues de una prolongada espiracion, con que quedan deprimidos los pulmones y negado el paso á la sangre desde el corazon; de esto resulta el acumulo en la parte de esta entraña que debia enviarsela.

La muerte natural acontece al hombre en todas partes á un tiempo casi determinado que es cerca los cien años; sin embargo es bien provado que cuanto mas pronto ha sido su desarrollo por cualquier causa que sea, el fin es tambien proporcionalmente acelerado.

Epoca de la muerte.

El hombre muere de toda edad y es raro que alguno llegue al termino natural de su ecsistencia. Las investigaciones sobre la provabilidad de la vida humana son muy inecsactas; no obstante la mas aprojimativa parece que ha sido, segun dice Richerand, en esta forma. „Despues de las averiguaciones hechas con el mayor cuidado de la edad en que ha muerto un crecido número de individuos y de la comparacion del número de los muertos con el de los nacidos, se ha llegado á averiguar que cerca de la cuarta parte de criaturas muere á los once primeros meses de su vida, la tercera parte antes de los veinte y tres, la mitad á los ocho poco mas ó menos.,,

Provabilidades de la vida humana.

Los dos tercios del género humano perecen antes de los treinta y nueve años, las tres cuartas partes antes de los cincuenta y uno; de suerte que como observa Bufon de nueve niños que nacen uno solo llega á noventa años, y finalmente de once mil nueve cientos ochenta y seis uno solo pasa de los ciento. El término medio de la vida segun el mismo es de ocho años en un niño que acaba de nacer.

De lo dicho se deduce que la vida se afianza mas y mas á medida que la criatura supera los obstáculos naturales de su incremento; pero que así mismo disminuye esta provabilidad á proporcion del tiempo que vive en la edad de decremento, de manera que á los ochenta años es ya estacionaria, y concluidos su ecsistencia es muy precaria.

Secso.

En la primera edad se hallan muy poco marcadas las delineaciones que distinguen al hombre de la muger: solo en los genitales externos se encuentra alguna diferencia que no pocas veces es muy oscura, pero al llegar á la pubertad se manifiestan los caracteres distintivos no solo en las partes genitales, si que en todas las del cuerpo sin escluir las internas, sobre todo á la muger en quien parece desarrollarse su fisico hasta establecer un temperamento particular que justamente merece el nombre de femenino por ser comun á todas las mugeres desde el desarrollo del secso hasta los cuarenta y cinco años, época en que deja de ejercer las funciones de tal.

Durante este tiempo en razon á la serie de funciones que debe desempeñar es su tejido menos sólido, menos apretado, menos coherente y mas expansivo; por ello son mas movibles y sensibles y menos estables, condiciones indispensables en su organizacion supuesto que debe

pasar la vida de revolucion en revolucion. Al entrar á la puertad el útero antes órgano inútil toma parte activa en la constitucion de la muger, de modo que se constituye el regulador de las funciones y el director de las oscilaciones nerviosas; es de donde se desprende el desarrollo orgánico y en donde se concentra la vida: el útero se entumece y se transforma en laboratorio de secrecion de un material, nocivo fuera de la época del embarazo.

Este flujo se llama menstrual y consiste en la trasudacion de un humor sanguineo ó sanguinolento que procede principalmente del útero, cola por la vagina por periodos determinados.

Este humor es naturalmente en algunas encarnado, en otras negruzco, en otras seroso; en unas muy abundante, en otras no tanto y en algunas muy corto. En las mas viene cada mes pero tiene muchas escepciones. Además es la muger por razon del secso destinada para algunas funciones como á la concepcion, embarazo, parto, lactacion &c. de que trataremos en las funciones sexuales.

Tambien el hombre por el secso experimenta, como hemos dicho tratando de la puertad, revoluciones muy sensibles y de mucha trascendencia hasta constituirse sus genitales centro de sensibilidad; y tambien los testículos que á los primeros tiempos de la vida no tuvieron uso ni influjo alguno, al llegar á la puertad se desarrollan y constituyen laboratorios del semen, humor prolífico, principal agente de la generacion.

*Secso mas-
culino.*

Temperamentos.

Se da el nombre de temperamento á ciertas diferencias físicas y morales que presentan los hombres, las que dependen de la diversidad de proporciones y relaciones de las partes que entran en su organismo no menos que

Definicion.

de los grados diversos de energía relativa de ciertos órganos.

Por esta disposicion particular cada hombre se aleja ó pierde mas ó menos el estado de salud perfecta y se dispone á enfermar particularmente; pues segun que la accion en algunos órganos es mas ó menos activa, mas ó menos inerte, es el individuo naturalmente conducido á diversas determinaciones habituales en sus funciones, resultando de la mayor energía relativa de algun órgano la preponderancia de este sobre los demas, y de aqui un modo particular de ecsistir.

A pesar de que cada individuo se distingue por su caracter particular y modo de ecsistir diferente del de todos los demas, y no obstante que muchas veces las funciones generales y comunes á todos, como la accion cerebral, del corazon, de la respiracion y digestion adquieren un grado de energía superior y modifican de un modo decisivo la constitucion del individuo, volviendo imposible el fijar una division en que pueda distinguirse el temperamento de cada uno de los hombres separadamente; admitiremos con todo la division de los antiguos considerando que conviene mucho el conservar sus denominaciones alomenos para entendernos, pero con la advertencia de que cada individuo distingue su temperamento de cualquier otro aunque tenga con él mucha semejanza; asi como que es imposible hallar un hombre con todos los caracteres que se esplican como propios de algun temperamento.

Se dividen los temperamentos en sanguineo, pituitoso, bilioso, melancólico y femenino.

El temperamento sanguineo es caracterizado por el conjunto de circunstancias que siguen: sólidos esponjosos bastante elasticos, sangre rutilante, predom-

minio de fuerzas digestivas y demas funciones asimilativas, la accion de los órganos libre, regularidad en las funciones, aspecto flórico, miembros carnosos, cara sonrosada y el porte desenvuelto franco y decidido; la susceptibilidad nerviosa muy viva y poco estable, la percepcion pronta, la memoria feliz, la imaginacion viva y agradable, inclinacion decidida á los placeres de la mesa y del amor, y su salud suele ser interrumpida por enfermedades cuyo asiento principal es en el sistema circulatorio.

Si los hombres de este temperamento por circunstancias favorables adquieren sus músculos un desarrollo proporcionado al del sistema sanguineo, aumentan de volumen y su temperamento sufre entonces una grande modificacion y resulta el muscular ó atlético manifestado por todas las señales del vigor y de la fuerza. En estos hombres forzudos y corpulentos se les observa la cabeza muy pequeña, el cuello inclinado principalmente hácia atrás, las espaldas anchas, el pecho estendido, los intervalos musculares muy manifestos, las articulaciones poco cubiertas de musculos aparecen muy pequeñas, los tendones y musculos se presentan tan demarcados y las proporciones tan ecsactas que forman el conjunto mas hermoso y chocante; y al paso que tiene bastante obtuso el sentimiento suple á esta desventaja su fuerza y violencia con que supera toda resistencia cuando sale de la calma en que habitualmente vive.

En el temperamento bilioso los movimientos circulatorios se ejecutan con rapidez, se distingue el predominio del corazon y de las fuerzas musculares, con un grado medio de perfeccion en las fuerzas digestivas, y el tejido de los sólidos es compacto y firme; las venas subcutaneas manifestas, el color del rostro moreno algo sonrosado ó amarillento, el pelo ne-

gro, mediana gordura y músculos medianamente demarcados; las pasiones violentas y el funcionar intelectual impetuoso: por ultimo estos hombres son atrevidos y constantes en la ejecucion de algun proyecto.

En el temperamento pituitoso ó linfático el sólido es flojo é inerte, poca energía en las fuerzas digestivas, la linfa y humores serosos preponderantes, el volumen del cuerpo grande, carnes blandas, hábito descolorido, cabellos rubios ó cenicientos, el pulso debil, lento y blando, en una palabra, todo denota indolencia é inaptitud para la ejecucion de los grandes movimientos; las pasiones lánguidas, la memoria infiel y la atencion poco estable.

En el temperamento melancólico reputado con fundamento mas como una afeccion morbosa hereditaria ó adquirida que como una constitucion natural ó primitiva, porque siempre suele acompañarle el desarreglo de alguna de las entrañas del vientre ó del sistema nervioso, se observan en los de este temperamento las funciones vitales débiles é irregulares, la piel de un color subido, la vista inquieta y asombrada, el vientre perezoso, el pulso duro y habitualmente constriñido, y tiene un predominio particular el sistema de la vena porta; la imaginacion rétrica y el caracter sospechoso, la testura de los sólidos bastante firme y compacta, los humores espesos y pocas fuerzas musculares, la tez morena con cierta languidez, cabellos negros y muy poblados. Los melancólicos en general son prudentes pero tercios, tristes, taciturnos y muy amantes de la soledad.

A estos temperamentos añaden algunos con razon el nervioso, tampoco natural y primitivo, cuyo caracter distintivo es la mucha susceptibilidad nerviosa; se adquiere por lo comun con la vida sedenta-

ria y poco activa, hábito de los placeres, ecsaltacion de ideas por el mucho discurrir etc. Se distingue este temperamento por la flaqueza del cuerpo, poco volumen de los músculos, blandura de los mismos presentandose como atrofiados, viveza de sensaciones, prontitud y variedad en las determinaciones y juicios.

Aunque despues del nacimiento nos proporcionamos las disposiciones particulares del cuerpo que constituyen nuestros temperamentos, debe advertirse que con la educacion, modo de vivir, clima, y hábitos contraídos se alteran y aun mudan del todo.

Al temperamento individual por el que cada uno tiene un modo particular de ser, se le dá el nombre de idiosincracia.

Como queda insinuado las mugeres durante el tiempo de serlo se hallan mas uniformadas que los hombres y no se notan diferencias tan sensibles en la forma del temperamento. Su fisico tiene mucha semejanza al de los niños; pues á la par de estos su tejido es muy flojo, blando, expansivo y débil; el celular es muy abundante y constituye la elegancia y hermosura de sus miembros, al paso que proporciona á sus vasos el dividirse y esparramarse en un sin número de ramificaciones. Sus humores tienen mayor grado de fluidez con relacion á los del hombre de que resulta la mayor facilidad en penetrar con todos sus caracteres hasta las ramificaciones mas finas. A mas las fuerzas multiplicadas por el considerable número de vasos proporciona el círculo mas libre y acelerado, así como la delgadez de las paredes de los vasos y la finura de la piel permite el que su sangre pueda manifestar el color al traves de ella y de aqui es el color rosado que comunmente tienen muy semejante al que gozan los sanguineos; sin embargo el tempe-

ramento femenino difiere del sanguineo del hombre con el cual tiene grande analogia , principalmente por el influjo que tiene sobre aquel el órgano uterino. Tambien sus sólidos son mas tenues, flojos y blandos, estado que coexiste con un desarrollo considerable del sistema linfático : en efecto se hallan en mucho mayor número los linfáticos que los sanguineos , y el cuerpo de ellas se presenta regado en mucha abundancia de jugos.

Siendo pues menos enérgico relativamente el sistema sanguineo que el linfático debe ser menor la disipacion y mayor la absorcion , porque la disipacion natural del cuerpo se atribuye justamente y se valúa por la energía vascular sangninea , y es por tanto consecuente que la muger pierde menos que el hombre : *nam corpus muliebri minus dissipatur quam virile. Hipp.*

El predominio de la fuerza digestiva es tambien patente en el temperamento femenino , y esta fuerza que preside á todos los actos del ser viviente como nutricion y demas secreciones, á la concepcion , al desarrollo del feto etc. parece hallarse enervada por la mayor susceptivilidad nerviosa que es otro de los caracteres distintivos del temperamento femenino.

A la verdad el sistema nervioso tiene en este temperamento una accion muy viva sea por el mayor desarrollo natural que experimenta , ó ya porque la testura floja del tejido de la muger permita mas facilmente el obrar á los estímulos. Ello es que la muger se halla muy dispuesta á toda clase de impresiones.

El temperamento femenino puede llamarse con razon sanguineo pero modificado , siendo sus atribuciones características la blandura de los órganos consecuente á la estension ó expansion de su tejido celular, el predominio del sistema linfático, la accion viva del sistema nerveo y el influjo de los órganos sec-

suales que produce en él las modificaciones mas sensibles é interesantes. El temple blando y flecsible del sólido que constituye la muger le proporciona la mayor aptitud para resistir á los trastornos continuados que debe sufrir atendido el destino que tiene de pasar de revolucion en revolucion.

La menstruacion y otros flujos de sangre á que está sujeta la muger, la nutricion del feto durante la preñez, y la secrecion de la leche en tiempo de la lactacion ecsigen un grado superior de energía en las fuerzas digestivas; y el modo evidente con que poderosamente influye el útero sobre las oscilaciones de su máquina ecsigía tambien que gozase de mucha energía para constituirse, como lo es, centro de sensibilidad fisica.

De esto y de la grande sensibilidad que se observa en el secso femenino depende la disposicion decidida que tiene á las enfermedades nerviosas, asi como que las mas pequeñas impresiones produzcan en él grandes desórdenes; pero muy lejos de serle perjudicial la escesiva sensibilidad, le es muy ventajosa porque cuanto mayores son las sensaciones son tanto menos permanentes y duraderas, lo que hace que pueda acomodarse mejor á sus revoluciones sucesivas.

El estado peculiar que acabamos de describir de la constitucion de la muger se pierde cuando acaba esta la aptitud de ser madre y adquiere entonces un temperamento bastante analogo al de los hombres. La época en que esto sucede no es igual pues contribuye á su mas ó menos pronta cesacion el clima y el género de vida; con todo en nuestro pais es de los cuarenta á cincuenta años.

Género de vida.

El modo de vivir de los hombres influye en gran manera sobre su físico y es lo que principalmente contribuye á las modificaciones del temperamento nativo. En el género de vida se comprende la educación, oficio y uso de las cosas que llaman connaturales á saber, alimentos, aire y demas que está en contacto con el cuerpo como vestidos etc., el movimiento y quietud, lo retenido y espelido, el sueño y vigilia y la moral individual ó sea pasiones del alma.

En la educación se comprende el régimen interior de cada familia y el general de las naciones por leyes que rigen en cada una de ellas. En el oficio las profesiones, materiales de que se hace uso, diversidad de movimientos y exposiciones que traen consigo. En el uso de las cosas connaturales lo que se dice en el apartado siguiente.

En los alimentos se comprenden, su cantidad, calidad y orden de tomarlos; en el aire sus condiciones químicas y físicas; en las cosas que tenemos en contacto su peso mas ó menos gravoso, las inmersiones, vestidos etc.; en lo retenido y espelido las proporciones de lo ingerido con lo escrutado; en el movimiento y quietud así como en el sueño y vigilia la proporción también que respectivamente deben guardar en razón á la edad, sexo, temperamento y estado actual de vida; por fin en las pasiones del alma la influencia que tienen sobre el cuerpo cada una de las dos series de pasiones deprimentes y exaltantes.

***Circunstancias generales y locales que influyen
para la vida del hombre.***

Las generales son principalmente el clima y estacion con las correspondientes variaciones topográficas; las particulares ó de recinto comprenden la topografía local ó de parte determinada y las emanaciones que por circunstancias locales se hallan en disolucion, mezcla ó convinacion con el aire alterando sus propiedades químicas y físicas.

FUNCIONES.

Por no ser posible analizar el modo intrínseco de obrar de la naturaleza para juzgar debidamente de los movimientos moleculares que forman el último resultado de la vida, cual es la nutricion y accion orgánica; nos limitaremos al estudio de sus resultados sensibles que son las funciones. *Funcion* pues no es mas que el efecto sensible de los órganos y aparatos en su pleno goze de vitalidad.

Se dividen las funciones en unas que nos ponen en relacion con los seres que nos rodean ó *funciones relativas*; otras que tienen por objeto la asimilacion de las sustancias estrañas dichas *asimilativas* ó *nutritivas*, y otras cuyo fin esclusivo es la reproduccion, y toman el nombre de *generativas* ó *sexuales*.

Las relativas comprenden los sentidos, la inteligencia, la voz y los movimientos voluntarios; las asimilativas la digestion, absorcion, circulacion, respiracion, sanguificacion, secreciones y nutricion; las sexuales divididas en masculinas y femeninas comprenden por parte del macho la secrecion y escrecion del semen, y la coabitacion; y por parte de la hembra la

menstruacion, coabitacion, concepcion, desarrollo del feto ó preñez, parto, y lactacion.

Para la mas facil inteligencia de todas me parece oportuno guardar un órden en el estudio de cada una siguiendo el mas comunmente admitido dando principio por las funciones relativas.

FUNCIONES DE RELACION.

Sentidos.

Estos son las funciones destinadas á recibir las impresiones de los objetos externos y trasmitirlas al sensorio: son la vista, oído, olfato, gusto, y tacto.

Vista.

La vista es la funcion que nos da á conocer la magnitud, figura, color, distancia, movimientos ect. de los cuerpos mediatos. Los órganos que componen el aparato de la vision entran en accion por un escitante particular llamado luz.

La luz es un fluido en extremo sutil desprendido de los cuerpos luminosos como el sol, estrellas fijas, cuerpos en ignicion, fosfóricos ect. No trataremos de este fluido con la estension que lo hace la fisica experimental por ser exclusivo de esta, y suponerse á los discípulos imbuidos en ella; solo recordaremos lo mas preciso.

Las moléculas de la luz se mueven con una rapidez tal que corren cerca ochenta mil leguas por segundo. Se llama *raio luminoso* una serie de moléculas luminosas que se suceden sin interrupcion en línea recta.

Al partir la luz de un cuerpo luminoso forma conos divergentes los cuales se prolongan indefinida-

mente sino encuentran obstáculos : á estos conos llaman *hacecillos luminosos*.

Cuando la luz en su curso encuentra cuerpos opacos varia su direccion sin penetrarlos y esta variacion se ve modificada por la disposicion del cuerpo. A este cambio de direccion llamamos *reflección*. Si los encuentra diafanos ó transparentes les penetra sufriendo un desvio cada vez que pasa de uno á otro de distinta naturaleza y se llama *refracción*. Sobre estos movimientos de la luz no menos que en la naturaleza y figura de los cuerpos que los modifican se funda la teoría del admirable fenómeno de la vision.

Los cuerpos refractan la luz en razon de su densidad y combustibilidad, y todos conservan poco mas ó menos el poder reflectente. Los cuerpos de figura lenticular, son los que presentan principalmente, el fenómeno de reunir los rayos que les atraviesan: el punto de reunion se llama *foco*. El color de los cuerpos pende de su disposicion molecular por la que absorbe y refleja mas ó menos la luz. Para poder hacerse capaz del mecanismo de la vision cuando se trate de ella en su lugar no deben perderse de vista las siguientes leyes de refraccion.

Cuando los rayos de luz pasan de un medio raro á otro mas denso de figura convexa se acercan unos á otros, y se apartan si la figura es concava; al contrario pasando de un medio denso á otro mas raro de figura convexa se apartan y si concava se acercan. Esto se hace evidente con solo consultar á la experiencia la que demuestra que los rayos de luz pasando de un medio raro á otro denso se acercan á la perpendicular tirada al punto por donde pasan, y al contrario se apartan pasando de un medio denso á otro raro, entendiéndose siempre respectivamente la rareza con la densidad y esta con aquella. Asi pues *medio* se llama todo cuerpo capaz de dejar pasar al traves de él alguna cantidad de luz.

Aparato de la vision.

El aparato de la vision lo componen tres partes distintas. La primera modifica la luz y es constituida por las partes protectoras del ojo, *tutamina oculi*; la segunda la recibe y modifica, y la forma el globo del ojo; la tercera transmite la impresion al cerebro, el nervio óptico.

La delicadeza del aparato óptico exigia tener una série de órganos que la protegiesen y conservasen en la aptitud necesaria: Estos son las sejas, parpados, pestañas, y vias lagrimales.

Las sejas tienen los usos siguientes: por su posicion elevada preservan al globo de las violencias exteriores; por la direccion de los pelos que las componen impiden que el sudor caiga sobre el ojo; y por el número, color y posicion de los mismos le garantizan de una luz viva sobre todo cuando viene de un lugar elevado, lo que logramos mejor frunciéndolas.

Los parpados cubren el ojo durante el sueño y le libertan del contacto de los estraños, le preservan de los choques con su oclusion casi instantánea y automática; con sus movimientos habituales se oponen á los efectos del contacto del aire y barren la córnea bañándola con el humor lagrimal; desvian en fin los rayos de luz cuando demasiado viva cerrándose algun tanto, y por la contraria abriéndose lo posible dan paso á los mismos en caso de luz debil.

Las dos hileras de pelos que forman las pestañas componen, cuando se acercan los parpados, una especie de reja que no permite pasar sino cierta cantidad de rayos á la vez. Amás separando en hacecillos los rayos luminosos que penetran dentro del ojo hacen que los cuerpos de noche aparezcan en ignicion;

esta aparición cesa luego que los parpados se apartan como tambien dando á las pestañas otra direccion. Las pestañas en fin apartan del ojo los átomos que voltean por el aire.

Las glandulas de meybomio colocadas en la *Humor seba-* espesura de los cartílagos tarsos segregan un humor *ceo de mey-* de naturaleza oleosa ó sebacea que pasando por los *bomio.* conductos escretorios de cada folículo viene á salir por otras tantas averturillas en la parte interior del parpado cerca de su borde ciliar. El uso principal de este humor parece ser el guarecer al ojo de los frotos palpebrales; asi es que el parpado superior que tiene los movimientos mayores tiene mayor número de glandulas y por lo tanto mayor cantidad de este humor.

Aparato lagrimal.

Componen el aparato lágrimal la glándula lagrimal y sus conductos escretorios, caruncula, puntos y saco lagrimales, con el conducto nasal.

La glandula lagrimal situada en la fosita de la pared esterna de la orbita segrega las lágrimas, las cuales pasan por los conductos escretorios que en número de seis ó siete nacidos de otros tantos granulitos, cuyo congunto forma la glandula, despues de haber corrido un poco sobre la conjuntiva vienen abrirse en la cara interna del parpado superior cerca el borde ciliar en el ángulo esterno, donde las dejan escapar sobre dicha membrana.

La caruncula lagrimal situada en el ángulo interno del ojo y compuesta de siete ú ocho conductillos, cuya disposicion local con las glándulas de meybomio, forman un círculo que tapa la parte anterior del ojo cuando separados los parpados.

Los puntos lagrimales uno en cada ángulo interno de los tarsos son las aberturas externas de los con-

ductos lagrimales que vierten las lágrimas al saco lagrimal, pequeño receptáculo membranoso situado en la fosita de la entrada del conducto nasal. Estos conductillos y sobre todo sus embocaduras se hallan dotadas de una atracción electiva vital por la que absorben exclusivamente las lágrimas, y se oponen frunciéndose á la entrada de otro cuerpo y aun de las mismas lágrimas cuando alteradas. Estas por el conducto nasal pasan á la cámara posterior de la boca.

La conjuntiva, membrana que une al globo del ojo con los párpados guarece la cara anterior de aquél, y el fluido que segrega mezclado con las lágrimas ofrece al ojo y párpados la correspondiente humedad y blandura barriéndolos, al mismo tiempo que impide la demora en ellos de algún extraño; mas la conjuntiva goza la facultad absorbente y con su lubricidad favorece los movimientos del ojo.

Globo del ojo y nervio óptico.

Estas dos partes componen lo mas principal del aparato de la vision. La posicion del globo en lo mas elevado del cuerpo, el corte oblicuo de las órbitas, la almoadá grasienta que las tapiza con otras circunstancias ofrecen para la vision grandes ventajas.

El ojo se compone de partes refringentes y de otras que no lo son. Las primeras son la cornea trasparente, humor aqueo, cristalino, y vitreo con sus capsulas correspondientes. Las que no refringen son; la esclerótica, la coroídea, el iris y la retina; de estas la coroídea absorve rayos, las demas los reflejan. La retina situada entre la coroídea é hialoydes es esencialmente nerviosa formada por una es-

pansion del nervio óptico ; es el plano sobre que trazan los rayos visuales las imagenes de los objetos de donde es transmitida la impresion al sensorio por medio del nervio óptico.

Mecanismo de la vision.

Para facilitar la comprension de este mecanismo supongamos un solo cono luminoso que partiendo de un punto siga la direccion del eje antero-posterior del ojo. Vemos entonces que solo puede servir para la vision aquel lumínico que toque la cornea y que los rayos que van á pasar á las partes no refringentes son reflejados y de nada sirven para el efecto.

La cornea por su transparencia permite el paso á los rayos mientras que su superficie lisa y pulida hace que algunos se reflejen y se constituya espejo. Por su poco poder refringente solo arrima al eje los rayos, con lo que se aumenta la intensidad de la luz que va á penetrar la cámara anterior.

Atravesando los rayos la córnea han pasado de un lugar mas raro á otro mas denso de figura convexa y por lo mismo han debido acercarse á la perpendicular haciendose convergentes ; y pasando al aqueo, medio aun mas refringente, convergen mas. De los que entran en la cámara anterior solo sirven para la vision los que pasan por la pupila, pues los que hieren al iris son reflejados y atravesando otra vez la córnea manifiestan el color del iris.

Mientras pasan por la cámara posterior no sufren refraccion porque no mudan de medio, pero llegando al cristalino experimentan una modificacion muy importante que consiste en reunir mas y mas los rayos visuales porque pasan de un medio mas raro á otro mas denso de figura convexa ; y con esto aumenta la intensidad de la luz.

No todos los rayos que pegan contra la superficie anterior del cristalino pasan al cuerpo vitreo, pues parte son reflejados, y de estos los que van á parar á la parte posterior del iris son absorbidos por la corooides.

Los rayos que pasan al vitreo se hacen aun mas convergentes, porque pasan de un medio mas denso á otro mas raro de figura concava. Sirve a mas este humor para distender la retina con que se aumenta el disco de vision. Los rayos luminosos que hieren al cristalino siguen la direccion del punto del cuerpo que pintan en la retina, de manera que lo que viene de abajo hieren la parte superior y los de arriba la inferior: asi es que las imágenes se pintan al revés en la retina.

Durante la vision el iris se cierra y disminuye la pupila en razon directa de la intensidad de la luz y sus movimientos son escitados simpáticamente por la accion de la luz sobre la retina.

Los rayos que habiendo atravesado el vitreo van á parar á la retina son los que pintan las imágenes. Ella las recibe por una accion vital siéndonos desconocido absolutamente su mecanismo; recibe la impresion de la luz hasta cierto punto, pues si es muy viva en lugar de servirle de estímulo fisico y exclusivo que la mueva á llenar sus deberes la escita fuertemente transformándose en centro de fluxion, y si es muy débil no la impresiona: todo esto debe entenderse con relacion á la susceptibilidad de la retina, porque si es mucha, menos luz basta, y si poca se necesita mas.

Sin embargo que la retina parece compuesta uniformemente de un tejido nervioso, se cree con todo que goza de una sensibilidad mas esquisita en su parte central. La impresion que recibe la retina la transmite instantaneamente al nervio óptico y este al sensorio.

Ambos ojos concurren á pintar una misma imagen, no obstante es ventajoso no emplear mas que uno cuando se quiere juzgar bien de la direccion de la luz ó de la situacion de un cuerpo, como en la caza para acertar los tiros, en las nivelaciones ect.

Si ambos ojos no gozan de una misma sensibilidad ó tienen diferente fuerza refringente se pintan dobles las imágenes, y los objetos se ven tambien dobles. El feto parece que no tiene sus ojos en aptitud para recibir la luz. En el primer mes del nacimiento da pocas señales de ser sensible á este estímulo, solo despues de algun tiempo da indicios de escitabilidad que va creciendo á medida que se aleja del nacimiento, y se perfecciona por una verdadera educacion sin que se altere en lo restante de la vida naturalmente hasta la vejez, en que por la disminucion de cantidad en los humores del ojo, por la opacidad de estos mismos y de la cornea, y por la disminucion de sensibilidad de la retina se debilita sucesivamente.

Oido.

Es una funcion destinada al conocimiento del movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros, llamado sonido. Este es el resultado de la impresion que produce en el órgano del oido un movimiento vibratorio imprimido á las moléculas de un cuerpo. Estas lo comunican á los cuerpos elásticos que les circuyen á mas ó menos distancia. El aire por lo regular sirve de medio de transmision del sonido, pero pueden los cuerpos elásticos aplicados inmediatamente al órgano y sin intermedio producirlo por si solos.

En el sonido se distinguen la intensidad, el tono, y el timbre. La intensidad depende de la estension de las vibraciones; el tono del número de vibraciones que se producen en un tiempo determinado, y por

esto puede ser agudo ó grave conforme sea mayor ó menor el número de ellas. El sonido apreciable se distingue del inapreciable en que en este el órgano no distingue el número de vibraciones de que se forma. Si un cuerpo da en sonido apreciable doble número de vibraciones que otro se llama octava de este,

Se llama el sonido *fundamental* el primero que se siente despues de una percusion sobre un cuerpo sonoro, *parmónico* el que se sucede sin interrupcion. El timbre depende de la naturaleza del cuerpo sonoro.

El sonido se transmite por cuerpos elásticos sucesivos perdiendo de su fuerza con respeto á la distancia como sucede con el aire, ó aumentando si se ponen en movimiento precipitado cuerpos susceptibles de efectuarlo. Los sonidos agudos y graves ect. todos corren con igual rapidez.

Si los sonidos se comunican en línea recta desde el cuerpo sonoro al oido se llama sonido directo, y si por reflexion de los raios sonoros secundario. De la lentitud con que se propaga conforme el cuerpo que refleja resultan ciertos fenómenos conocidos con el nombre de *eco*, *cámara misteriosa* ect.

Mecanismo del oido.

Sin hacer mension anatómica de las complicadas circunstancias del órgano auditivo por considerar á los discípulos enterados de ello, y parecernos mas curioso que útil, alomenos el conocimiento de la estructura del oido interno para el dragnótico y tratamiento de las dolencias, nos limitaremos en esponer sucintamente el mecanismo de la audicion.

Los raios sonoros conducidos por medio del aire hasta la oreja son replegados por la concha y dirigidos al conducto auditivo externo, el que los transmite en parte por su naturaleza elástica y en parte

por el aire hasta la membrana del tambor; de aquí es que puede perderse esta membrana sin perderse la audición.

Los rayos transmitidos al tímpano conmueven todas las partes contenidas en este y se comunican al oído interno en parte por el aire contenido y renovado por la trompa de Eustaquio que vibra principalmente á la membrana de la ventana redonda, y en parte por la cadena osea que obra mas directamente en la membrana oval. Pasan al conducto auditivo interno en donde por contacto de vibración osea y por undulaciones de la linfa de cotunni se comunican al nervio acústico, y este es el medio de comunicación con el sensorio. El modo de obrar para producirlo es del todo desconocido.

Para que el sonido se perciba con perfección conviene que los rayos tengan las modificaciones correspondientes de intensidad en razón á la susceptibilidad de las partes que deben recibirlos.

Es verdad que un mismo sonido produce simultáneamente la impresión en ambos oídos, sin embargo cuando debemos juzgar de la perfección y armonía de un sonido se facilita mas bien aplicando un solo oído. No sucede así cuando es preciso juzgar de la distancia, pues para conseguirlo es preciso que nos sea familiar la naturaleza del sonido, sin cuyo requisito no puede darse por cierto el que un sonido muy intenso parta de un lugar vecino mientras que el débil de un lugar lejano.

Acción de los dos aparatos.

Los diferentes grados de convergencia ó divergencia de los rayos sonoros no sirven tanto para la audición, esto es, para modificar la marcha de los rayos sonoros, como para proporcionar la entrada de mayor ó menor número; por esto cuando pretendemos reunir rayos por ser duro el oído nos valemos de una trompeta acústica, al contrario cuando el sonido es

muy intenso ó la susceptibilidad mucha, aplicamos en el conducto auditivo externo un cuerpo blando y poco elástico.

Modificaciones por la edad.

El feto y el infante recién nacido no pueden ser afectados de la impresion de los raios sonoros porque tienen imperfecto el órgano del oído; sus partes poco elasticas y llenas de moco no vibran á la impresion de los raios, pero á medida que ellas van adquiriendo consistencia y se desarrolla la perfeccion orgánica entran en aptitud sucesiva: despues de algun tiempo del nacimiento, solo percibe los sonidos agudos y se pasa mucho mas, antes que el infante pueda juzgar de la intensidad y direccion del sonido, bien que esta falta se debe en gran parte à la imperfeccion del sensorio.

Aunque el aparato auditivo se perfecciona físicamente con la edad, es cierto no obstante que el oído se vuelve duro en la vejez, de modo que hay pocos viejos que no sean mas ó menos sordos. Esta circunstancia puede creerse debida en parte á la disminucion de linfa de cotunni y en parte á la obtusion progresiva de la sensibilidad del nervio acustico.

Olfato.

Los cuerpos con respecto al olfato se dividen en odoríferos é inodoros: los mas pertenecen á los primeros y son todos aquellos que permiten escapar sus partes integtantes en moléculas sutiles transportables por el aire, siendo el sentido del olfato, cuyo aparato es la nariz, el destinado para conocerlas y apreciarlas.

Hay cuerpos que las desprenden pronto y otros que tardan mas; en unos se conserva la facultad de desprenderlos por largo tiempo, y en otros es pasajera; unos solo dan olores fuertes y otros suaves ect.; pero cada cuerpo tiene su olor particular.

Se dividen los olores en débiles y fuertes, agradables y desagradables; son aromáticos, fétidos, virosos, espermáticos, picantes ect., siendo en los mas de los casos imposible distinguir un olor sino comparándolo con otro de un cuerpo conocido.

El aire es el vehiculo ordinario de los cuerpos *Vehiculo de* odoríferos y los conduce á la nariz mediante una *los olores.* inspiracion para producir en este aparato la sensacion que llamamos olor. La membrana pituitaria cuya testura es casi del todo nerviosa, porque es formada en gran parte por los nervios olfatorios, recibe la impresion: ella es el órgano esencial del olfato.

Basta para producirse esta función que las moléculas odoríferas sean presentadas á la pituitaria, particularmente en los parages donde recibe mas filamentos del nervio olfatorio; con todo es preciso para que pueda efectuarse la impresion que esta membrana se halle cubierta de un moco que la mantenga húmeda, al propio tiempo que proporcione el pegarse y detenerse en ella las particulas odoríferas.

La sensibilidad de la dicha membrana es muy *Sensibilidad* viva porque las papilas nerveas que se distribuyen *de la pitui-* en ella están casi desnudas; no se limita su *taria.* esquisitez á los olores sino que se resiente con viveza de cualquier otro estímulo, siendo de las mas fáciles en irradiar la impresion al cerebro y corazon.

Los nervios olfatorios son los medios de comunicacion entre la pituitaria y el sensorio.

El aparato olfatorio es poco desenvuelto en el *Modificacio-* nacimiento, y parece se desarrolla progresivamente con *nes del olfa-* la edad hasta la vejez á medida que se desarrollan *to por la* las cavidades nasales y sus senos. Es el sentido que *edad.* permanece naturalmente mas tiempo en perfeccion, es decir, que experimenta menos vicisitudes por la edad.

El olfato nos da nociones acerca la composici-

son de los cuerpos y sobre todo de los alimentos. En general un cuerpo de un olor desagradable es poco util y amenudo nocivo; por otra parte el olfato es un manantial de sensaciones de grande influencia en el espiritu y pasiones.

Gusto.

Sabores y su division.

Sabor es una sensacion producida por la impresion de ciertos cuerpos en el órgano del gusto. La sabrosidad de los cuerpos es en razon de su naturaleza quimica y género de afecciones que producen sobre la economia animal. Se divide el sabor en acre, acido, amargo, dulce, acervo etc; pero ninguna division mas adecuada que la de grato é ingrato, pues los cuerpos cuyo sabor es agradable son los mas apropiados para la nutricion, y si desagradable son con frecuencia nocivos.

Aparato del gusto.

La lengua es el órgano principal del gusto, sin embargo gozan de esta prerrogativa los labios, encias, paladar, farinx etc. Las glandulas salibales y los folículos mucosos concurren considerablemente para la funcion del gusto. Todos los nervios que se distribuyen por la lengua sirven para efectuar dicha sensacion, pero al nervio lingual del quinto par le consideran algunos como principal.

Para efectuarse el gusto es preciso que el cuerpo sabroso esté aplicado inmediatamente sobre el órgano, que este se halle en estado de perfeccion, que su membrana mucosa sea barnizada por un humor mucoso, y que los humores de la boca colen en bastante cantidad.

Los cuerpos sólidos necesitan disolverse para producir la impresion del gusto, pero es problematico que los cuerpos obren quimicamente formando descomposiciones y nuevas combinaciones para producir el gusto.

Hay cuerpos que dejan por mucho tiempo su sabor en la boca y son principalmente los aromáticos. Este sobregusto se siente á veces en toda la boca y otras solo en algun punto. Los cuerpos acres lo dejan en el farinx, los ácidos en los labios y dientes, y la menta piperita la deja á la vez en la boca y en el farinx etc.

Para poderse apreciar debidamente el gusto de un cuerpo sabroso es preciso permanezca algun tiempo en la boca meneandole en ella ; si pasan rapidamente apenas se percibe su gusto. Despues de haber gustado un cuerpo cuyo sabor es muy fuerte no se siente el de otro que lo tenga debil; pueden con todo percibirse muchos sabores á la vez; pero para apreciarlos bien conviene haberse acostumbrado á ello.

No puede asegurarse si el gusto ecsiste en el feto: es cierto que el órgano se halla desenvuelto y que ecsiste ya en el recién nacido como puede conven- *Modificacio-
nes por la
edad.* cerse de ello aplicando en sus labios una materia salada ó amarga en cuyo caso hacen demostraciones de sufrir una impresion muy viva.

El gusto permanece hasta la edad mas avanzada aunque vuelve debil con el tiempo. La perdida del gusto es relativa á la intensidad de los sabores de que han hecho uso los hombres. Mas la falta sucesiva del gusto esta enlazada con las necesidades del organismo que reclama escitantes mas vivos para conmover la sensibilidad general cuando por el habito se halla ya embotada y poco escitable. Por medio del gusto conocemos la composicion de los cuerpos.

Tacto.

El tacto es un sentido que nos da á conocer la mayor parte de las cualidades de los cuerpos ha-

muchas *cualidades tangibles*, á saber, la dureza, blandura, lisura escabrosidad, humedad, sequedad, dimensiones, consistencia, peso, temperatura, movimientos de vibracion etc.

Se distingue el tacto del tocar.

Puede distinguirse el tacto del tocar en que esta facultad es peculiar á ciertas partes, como pulpejos de los dedos de las manos; es exclusivo del hombre y escije la contraccion muscular para efectuarse; mientras que el órgano del tacto lo es toda la superficie cutanea y mucosa y es comun á todos los animales; en fin el tacto es pasivo, y la facultad de tocar es un movimiento activo.

Aparáto.

El aparato del tacto es pues la piel siendo los nervios los órganos de comunicacion para con el cerebro.

Mecanismo del tacto.

Basta arrimar la piel á un cuerpo para apreciar sus cualidades tangibles; sin embargo á veces nos hace juzgar mal principalmente acerca la temperatura, así es que un aposento que guarde siempre una misma temperatura le creemos mas frio en verano y mas caliente en invierno, pues el tacto nos avisa de la temperatura solo haciendo una comparacion con la de la atmosfera.

No todos los puntos de la piel gozan igual grado de sensibilidad; es cierto que un mismo cuerpo aplicado sucesivamente sobre diferentes puntos produce otras tantas impresiones variadas; es mas per-picaz donde es mas delgada la epidermis, si sobre todo está la parte humedecida ó si vale decirse, es el órgano del tacto una membrana mucosa, v. g. los labios, el glande, conjuntiva; lengua, pituitaria, vagina &c.

Mecanismo del tocar.

La mano es el órgano principal del tocar porque reúne todas las circunstancias mas ventajosas para efectuarlo. El epidermis es fino, delgado y esponjoso, la transpiracion abundante y la secrecion oleosa, el corion poco espeso, los botones vasculares muy

numerosos, muchos vasos y muchos nervios. La piel adiere á la aponeurose por fibras y está sostenida por un tejido celular grasiento muy elastico.

Son principalmente los pulpejos de los dedos en que estas disposiciones estan á la mayor perfeccion. Los movimientos de la mano son fáciles y multiplicados de modo que esta parte puede aplicarse á todos los cuerpos sea cual fuera su figura. Mientras la mano está inmóvil á la superficie de un cuerpo no obra mas que como órgano del tacto; para el tocar ecsige que se mueva discurriendo la superficie del cuerpo que toca. Cuando el cuerpo es grande empleamos toda la mano, pero cuando muy pequeño solo empleamos la punta de los dedos.

Se considera al tacto y tocar como preponderantes á los demas sentidos.

El feto no goza la facultad del tocar; el infante tampoco la goza pero si la del tacto. Se deterioran con la edad, y el viejo las tiene muy obtusas porque en esta edad han disminuido las ventajas que procuraron la perfeccion en la juventud: la piel sufre cambios notables, la epidermis no es tan esponjosa, la transpiracion es imperfecta, el corion se seca, la gordura ha disminuido y el tejido celular ha perdido la elasticidad; por fin ha disminuido la facultad de sentir. El tocar es susceptible de adquirir con el ejercicio un grado muy alto de perfeccion.

Modificaciones por la edad.

Sentidos internos.

Todos los órganos tienen la facultad de transmitir al sensorio las impresiones causadas por los cuerpos exteriores; solo las partes duras y semiduras no la gozan en el estado sano. Asimismo todos los órganos pueden transmitirse espontaneamente, y sin intervencion de causa alguna exterior, muchas impre-

siones que pueden dividirse en tres especies. Las primeras nacen antes de obrar los órganos por una necesidad de conservacion: tales son el hambre, sed, necesidad de orinar, de respirar, apetitos venereos etc. Las segundas se efectuan durante el obrar de los órganos, como las sensaciones que acompañan las diferentes escreciones, las que nos advierten de nuestros movimientos, de los períodos de la digestion etc. Las terceras se manifiestan cuando los órganos han obrado, tales como el sentimiento de las fatigas variables segun las diferentes funciones: pueden añadirse á estas las impresiones morbosas. Todas las sensaciones independientes de la accion de los cuerpos exteriores se llaman internas ó simplemente sensaciones.

Todo lo que ecsiste puede obrar sobre nuestros sentidos, y el conocimiento positivo que tengamos de cualquiera cosa exterior nace esclusivamente á favor de este medio; asi es que las sensaciones forman la primera parte de la vida de relacion.

Entre las causas exteriores que ponen en movimiento nuestros sentidos unas obran directamente sobre los órganos, y otras ecsigen un cuerpo intermedio, como la luz, los cuerpos odoríferos, los rayos sonoros etc. Los mas de los cuerpos pueden accionar sobre muchos de nuestros sentidos, pero los hay que solo tienen influencia sobre alguno.

Los aparatos de las sensaciones ó sentidos son formados de una parte exterior dotada de propiedades fisicas relativas á las de los cuerpos, y de otra, los nervios, destinada á transmitir la impresion al sensorio.

Los nervios que forman la parte de comunicacion gozan la facultad esclusiva de sentir la primera impresion; pero los de los sentidos á mas de esta facultad comun á todos tienen la de transmitir el

obrar de algunas causas particulares, así el nervio olfatorio á mas de la facultad general á todos los nervios de comunicar al cerebro cualquiera impresion, tiene la esclusiva de transmitirle la de los olores hasta poderlos apreciar debidamente.

No obstante la imposibilidad en ensayar el origen y terminacion de los nervios, debemos considerarles dos extremos; uno cerebral porque está en el cerebro, y otro orgánico porque está en los órganos. Las ramificaciones de los nervios se comunican unas con otras mediante los plecso y ganglios, siendo este medio por el que se comunican los cerebrales con los espinales, y unos y otros entre si.

Sea cual fuera la opinion acerca la accion de los nervios ó de su modo de obrar para producir las sensaciones, debemos considerarles dotados de una propiedad vital que llamamos animal, perceptiva ó relativa, la cual sin podernos remontar al mecanismo ni hacer comparaciones ecsactas para esplicar sus fenómenos es el origen de las sensaciones, resultando cierto que los nervios son los agentes de transmision de las impresiones recibidas por los sentidos.

Las sensaciones se dividen en vivas y debiles. La primera vez que un cuerpo obra sobre nuestros sentidos produce en general una impresion viva; pero la vivacidad disminuye á medida que se repiten las aplicaciones, hasta resultar anulado el sentimiento porque el hábito embota la sensibilidad.

La disposicion de estructura de los órganos que constituyen el animal contribuye en gran manera acerca la susceptibilidad de los nervios para producirse las sensaciones con mas ó menos intensidad.

Podemos aumentar la vivacidad de las sensaciones á nuestra voluntad disponiendo los aparatos sensitivos de modo que no recibamos á un tiempo mas que un corto número de sensaciones, pues en- *Se pueden aumentarlas voluntariamente.*

tonces nos es mas facil llevar sobre ellas nuestra atencion: de aqui nace la diferencia importante que hay entre ver y mirar, oir y escuchar, tocar y palpar etc.

Se pueden disminuir.

Del mismo modo podemos disminuir la vivacidad de las sensaciones; así es que fruncimos las cejas, acercamos los parpados cuando la accion de la materia de la luz es muy viva etc.

Los sentidos se influyen mutuamente.

Los sentidos se influyen mutuamente: el olfato parece la guia del gusto, y al contrario; el tacto sirve de perfeccion á la vista, y así de las demas. La pérdida de un sentido aumenta la vivacidad de los otros.

Las sensaciones son agradables ó desagradables: cuando la primeras son vivas forman el placer, y las segundas constituyen el dolor. Por el dolor y el placer nos conduce la naturaleza á concurrir al órden que ella tiene establecido entre los seres organizados.

Conviene advertir que las sensaciones que vienen de los sentidos son en general desnudas, y distintas, y que las ideas y todo conocimiento que tengamos de la naturaleza resultan de ellas esencialmente; mas las sensaciones interiores ó sentimientos no presentan estos caracteres porque en general son confusas, vagas y con frecuencia ningun conocimiento tenemos de ellas, ya sean permanentes, ya fugaces.

Las mismas leyes de la organizacion hacen que una misma impresion en el modo de obrar los órganos para el ejercicio de sus funciones sean agradables ó desagradables, segun que los mismos obran libremente ó en estado morboso.

Son infinitas las causas que modifican las sensaciones externas é internas. La edad, el sexo, el temperamento, las estaciones, el clima, el hábito

y la disposicion individual, son otras tantas circunstancias que cada una separadamente basta para producir modificaciones numerosas en las sensaciones, y reunidas deben precisamente tener un resultado mas manifesto: es cierto que cada uno tiene su modo de ser ó de sentir.

El feto no goza mas que de sensaciones internas. Al nacimiento, y algun tiempo despues no existen aun todos los sentidos; solo se egercen el gusto, el tacto y el olfato.

*Los sentidos
deben ser
educados.*

Cada sentido debe correr diferentes grados antes de pasar al de perfeccion; es pues indispensable someterle á una verdadera educacion. Esta es mas lenta y mas dificil para las sensaciones que se egercen á distancia, y es mas pronta para las que se perfeccionan con el tacto. Mientras dura esta educacion de los sentidos, esto es, en la primera infancia, las sensaciones son confusas y débiles, pero van desarrollándose con el habito, hasta que en la edad joven se hallan ya grabadas profundamente en la memoria. A medida que progresa la edad las sensaciones van perdiendo por grados la vivacidad y se perfeccionan con respeto á la ecsactitud hasta que llegando á la vejez se debilitan y solo se producen con dificultad y lentitud.

De las funciones del cerebro.

Inteligencia.

El entendimiento del hombre se compone de fenómenos de tal modo diferentes de lo que presenta la naturaleza, que pueden considerarse como emanacion de un ser supremo.

Cualquiera que sea el número y diversidad de

fenómenos que pertenecen al entendimiento humano, nos es indispensable considerarles como el resultado de la acción del cerebro, y como los demás, dependientes de la acción de un órgano; en efecto las funciones del cerebro se hallan sometidas á las mismas leyes generales que las demás funciones, ellas se desarrollan y deterioran con la edad, se modifican por el hábito, el sexo, el temperamento y la disposición individual; se trastornan, se debilitan ó se exaltan en las enfermedades; las lesiones físicas del cerebro las pervierten y destruyen; en fin de las funciones del cerebro, á la par de todas las demás, no podemos remontarnos á su explicación, si solo limitarnos á la observación y experiencia despojándonos de toda idea hipotética.

Su estudio es puramente fisiológico. Sin embargo una ciencia particular, la ideología, se ocupa especialmente á este objeto.

Los innumerables fenómenos que forman la inteligencia humana no son mas que modificaciones de la facultad de sentir. Estas son cuatro: 1.^a la *sensibilidad* ó sea la acción del cerebro por la que recibimos las impresiones externas é internas; 2.^a la *memoria* ó facultad de reproducir las impresiones ó sensaciones precedentes; 3.^a el *juicio* ó facultad de sentir relaciones entre las sensaciones; 4.^a los *deseos* ó la *voluntad*.

De la sensibilidad.

La facultad de sentir tiene dos partes: la primera es la transmisión de la impresión que algun cuerpo haga sobre alguno de nuestros sentidos, la segunda es la percepción que se hace en el cerebro de la impresión recibida. Esta percepción forma la idea.

La sensibilidad varia al infinito; en algunos es obtusa, en otros tiene un grado de exaltación es-

traordinaria, y el que goza de una buena organizacion la tiene en general entre estos dos extremos.

En la infancia y juventud la sensibilidad es viva, y se mantiene mas ó menos hasta pasada la edad adulta; pero en la vejez experimenta evidente disminucion; el viejo decrepito llega á tal extremo que parece insensible á todas las causas ordinarias de las sensaciones.

De la memoria.

Se llama *memoria* la reproduccion de las ideas adquiridas poco antes, y se llama *subvenir* cuando las ideas son mas antiguas. La *reminiscencia* es la reproduccion de una idea que no se acuerda haberla tenido antes. La memoria experimenta las mismas modificaciones que la sensibilidad con respecto á la edad.

Del juicio.

El juicio es la facultad intelectual mas importante, porque por ella adquirimos todos nuestros conocimientos; sin ella nuestra vida seria puramente vegetiva, y no tendríamos idea alguna de la existencia de los seres, ni de nosotros mismos.

Hacer un juicio es sentir relaciones entre dos ideas ó entre dos grupos de ellas, y un encadenamiento de juicios forma el razonamiento. El modo diferente de sentir las relaciones ó de juzgar establece la diferencia de los hombres entre sí. La vivacidad de sensaciones parece dañar á la exactitud del juicio; es por esto que se perfecciona con la edad.

Del deseo ó de la voluntad.

Llamamos *voluntad* aquella modificacion de la facultad de sentir por la que aprobamos la pue desea-

mos. La *moral* es la ciencia cuyo objeto es dar la mejor direccion posible á nuestros deseos. En general las circunstancias físicas en medio de las que el hombre se halla situado influyen mucho acerca el desarrollo de su entendimiento.

Del instinto y de las pasiones.

La naturaleza que no ha abandonado á los animales á sí mismos, hace que cada uno de ellos ejerza una série de acciones de que resulta el enjambre maravilloso que se ve entre los seres organizados; así es que les ha dotado del instinto, esto es, de pensamientos, inclinaciones, y necesidades por las cuales se ven continuamente escitados y al mismo tiempo forzados á llenar las intenciones de la naturaleza.

El instinto puede ecsistir de dos maneras diferentes; con conocimiento de objeto y sin él. El primero se llama instinto claro, y el segundo instinto bago ó bruto: este pertenece principalmente á los animales brutos, aquel al hombre.

El instinto del animal tiene doble objeto, esto es, ó se dirige á la conservacion del individuo, ó á la conservacion de la especie. Cada animal trabaja segun su organizacion y por esto son tan diferentes los instintos, cuanto lo son las especies; por fin como la organizacion varia en cada individuo, tambien el instinto presenta diferencias individuales.

En el hombre se reconocen dos generos de instinto; *animal y social*. El animal es el que acabamos de decir; el segundo al paso que depende de la organizacion se desenvuelve en tanto que el hombre vive en sociedad civilizada. Al primero corresponden el hambre, la sed, necesidad de vestidos, de habitación, deseos de bien estar, el temor, el dolor, el deseo de hacer daño, deseos venereos, amor á los

hijos, la tendencia à imitar, á vivir en sociedad ect.

Entre todos los animales ninguno como el hombre tiene los sentimientos instintivos tan numerosos y variables. Los instintos sociales son el sentir vivamente la existencia de cuya inquietud maquinal nacen deseos vagos escitados por el recuerdo importuno de sensaciones vivas que ha sufrido: para salir el hombre de este estado se ve forzado á cambiar continuamente de objeto ó de alternar las sensaciones de un mismo género: de esto nace la inconstancia y el frenesí que incesantemente atormentan al hombre civilizado y ocioso.

La necesidad de sentir vivamente es balanceada por el amor al reposo, ó por la pereza. Estos dos sentimientos contradictorios se modifican el uno al otro, y de su reaccion recíproca resulta el amor al poder, á la fortuna y á la consideracion. A mas de estos sentimientos hay otros en el estado social que si bien menos importantes son muy numerosos.

Las necesidades naturales influyen sobre las sociales y estas modifican las primeras. La edad, el sexo, el temperamento ect. coadyuban tambien en gran manera á las modificaciones del instinto.

De las pasiones.

Se entiende por *pasion* un sentimiento instintivo que llega á estremado y exclusivo. En efecto el hombre apasionado ni ve, ni entiende, ni existe mas que por aquel sentimiento; y como pasa á ser doloroso se le ha dado el nombre de *pasion*. Las pasiones tienden al mismo objeto que el instinto, y como estos, conducen á los animales al obrar segun las leyes generales de la naturaleza viva.

En el hombre se consideran dos géneros de pasiones, *animales* y *sociales*. Las animales se dirigen

como el instinto á la conservacion del individuo y de la especie. A la conservacion del individuo pertenecen la cólera, tristeza, hambre ect., á la de la especie los deseos venereos estremados.

Las sociales son los sentimientos del mismo instinto estremado: pertenecen á ellas la ambicion, el deseo de mandar, la avaricia, la ira, la venganza ect. Si las necesidades desarrollan el entendimiento, las pasiones dirigen al hombre á las grandes empresas; las pasiones no tienen sitio conocido, nonostante que es cierto resultan de la accion del sistema cerebral. Al paso que no podemos explicarlas, conviene conocerlas para dirigirlas, calmarlas, y siempre atenderlas.

De la voz y movimiento.

La voz y el movimiento con las funciones precedentes forman la vida de relacion: estas últimas procurandonos el conocimiento de ellos, y los primeros nos ponen en la relacion mediante obrar sobre los cuerpos exteriores. La voz y el movimiento voluntario son ambos el resultado de la accion muscular.

Aparato del movimiento.

Tres géneros de partes entran en el aparato del movimiento muscular: los músculos que son las potencias del movimiento; los nervios que son los instrumentos, por los que el cerebro determina los movimientos; y los huesos que son los que dan la estabilidad al cuerpo para que puedan correr los miembros en el movimiento. Los dos primeros géneros de partes obran activamente, pero el sistema huesoso es pasivo.

Para que el movimiento pueda efectuarse, se exige la buena disposicion de los tres sistemas, de modo que la imperfeccion de alguno de ellos produce la del movimiento.

Músculos.

Las circunstancias precisas de organizacion que exige el músculo para cumplir con la funcion del movimiento pueden reducirse á dos series; conformacion y vida.

En la conformacion se comprende su estructura, posicion y conecision.

La estructura supone el número, dimension y direccion de las mismas fibras que componen el músculo. Para hacerse cargo de la necesidad del concurso de las circunstancias comprendidas en la estructura basta decir que la fuerza del movimiento es relativa al número de fibras, que la estension del movimiento es proporcionada á la longitud de las mismas, y que la inclinacion de lo movido es en razon á la direccion de la fuerza movente: así pues si dos miembros, por egemplo, en igualdad de circunstancias el uno se mueve á beneficio de la mitad mas de fibras que el otro, se moverá aquel con doble fuerza que este: si la longitud de la fuerza movente es mayor, será mayor la estension del movimiento, y este será en direccion á la que tenga la misma fuerza.

Conviene advertir que la direccion de la fuerza movente no supone solo la direccion de las fibras del músculo, sino tambien la del mismo musculo

De la posicion del músculo depende el que este obre con mas ó menos ventaja. En la conecision se debe comprender, á mas de los dos extremos del músculo los cuales por razon al parage de la palanca en que se hallan proporcionan ventajas á la fuerza y á la direccion, la que tienen con las partes vecinas.

Las circunstancias de vida del músculo son de

la orgánica y de la animal, porque de nada les serviría la influencia nerviosa sino estuviere dotado de la vida vegetativa que constituyen el tono ó la fuerza. Bajo este respeto puede considerarse al músculo como una máquina de grande fuerza movida por un resorte en que la fuerza nace de la consistencia de las partes que entran en su estructura, y el resorte es una fuerza elástica: la vida orgánica da la consistencia y la fuerza al músculo, y el influjo cerebral es el resorte que le mueve.

Cualquiera que sea la estructura, posicion y coneción del músculo; se halla formado de manojos de fibras carnosas, estos de hacecillos, estos de otros menores unidos entre sí por un tejido celular bastante firme por quien trascolan los humores que deben regarle y nutrirle.

Cada fibra muscular así como todos los hacecillos reunidos ó el músculo tienen la facultad de contraerse y alargarse. En la contraccion que precede siempre á la estension la fibra se acorta y se pone mas consistente, porque se acercan sus partes integrantes unas á otras. Con esta accion se dislocaria por enmedio de las demas, sino se lo impidiese la baina celular que le envuelve y le mantiene en determinados limites; baina que embolvien-do tambien cada hacecillo en particular, y estendiendese para formar bainas á manojos de hacecillos hasta unir unos con otros y embainar en fin todo el musculo, sujeta á todas estas partes haciendoles guardar la posicion natural. Sin embargo no deja de suceder esta dislocacion al egercer un movimiento ecsasperado. La propiedad que tienen los musculos de contraerse, debe atribuirse á la disposicion particular del tejido que los forma.

Las fibras musculares ó motrices se adieren á los tendones que por su tejido mas apretado son sus-

ceptibles de pegarse fuertemente á las partes duras, y suportar bien el peso de las palancas sin romperse.

Cuando un musculo se contrae, se endurece, sus fibras se arrugan, sus estremidades se aproximan, y haciendo con esto un esfuerzo de tirantez sobre el tendón que le termina atrahe consigo el punto en que se ata, y en esto consiste el movimiento activo. Este debe ser reemplazado por otro antagonista de igual mecanismo, cuya fuerza siendo de dirección diametralmente opuesta consume el movimiento total ó perfecto destruyendo al primero. La contracción de los musculos no debe confundirse con el encogimiento orgánico, ni con la contractilidad orgánica, pues estos fenomenos son de la vida vegetativa, y aquella es puramente animal ó nerviosa; ni tampoco conviene confundir la movilidad muscular con la estabilidad ó fuerza del musculo porque esta está en razón directa del número y calibre de los vasos sanguíneos, y aquella de los nervios. Tampoco deben confundirse con los fenómenos morbosos, como las diferentes especies de espasmos.

Los musculos mas estables son por lo comun menos movibles porque la fuerza nerviosa está en razón inversa de la vegetativa, y por esto los hombres mas estables son los menos movibles ó ágiles.

En razón á lo dicho acerca el mecanismo de los musculos es consecuente que unos contravalancen la fuerza de los otros, y que el movimiento perfecto consta de dos partes *flección* y *extensión*.

La duración de cada movimiento, al paso que se halla sometida á la voluntad, tiene sus límites; pues un músculo no puede permanecer mucho tiempo en contracción, porque se cansa y llega al fin á no poder suportar el peso del miembro con esa

teoría es fácil explicar el porque no podemos guardar inmóviles una misma posición de acción muscular.

La fatiga muscular se vence con el reposo porque con este los músculos vuelven á recuperar su fuerza.

La viveza y agilidad de los movimientos depende de la influencia cerebral ó de la voluntad; sin embargo el hábito y educación contribuyen mucho para llegar á la mas posible perfección.

El hábito influye tanto sobre el movimiento que puede llevarlo fuera de la esfera de la voluntad, y no es raro ver algunos que ejercitados voluntariamente en hacer gestos por mucho tiempo los efectúan al fin automáticamente y contra su voluntad.

Modificaciones de la contractilidad muscular por la edad.

Hasta el quinto mes apenas experimentan los músculos del feto contracción sensible; desde esta época hasta el nacimiento se van haciendo sucesivamente mas sensibles, pero como automáticos; y continúan ejerciéndose sin influencia de la voluntad hasta los dos primeros meses del nacimiento en que ya empiezan á ejecutarlos voluntariamente. La fuerza y contracción muscular se desarrolla progresivamente, y sobre año y medio las posee en alguna aptitud para procurar relaciones de locomoción.

En la infancia y juventud la nutrición de los músculos se acelera y crecen particularmente en longitud. Al llegar á la edad adulta las formas cambian de nuevo, los músculos crecen en espesor, y tienen toda la fuerza y vigor de que son susceptibles, se ponen mas consistentes y de un color mas subido; parece que los del adulto contienen mas fibrina, ozmasoma y parte colorante de sangre, y por consiguiente mas hierro.

En el viejo la nutrición se disminuye no menos que la influencia nerviosa, por consiguiente los

musculos son debiles , sus carnes coriáceas y estri-
gosas , las contracciones lentas y llegan á no poder
sostener el peso del cuerpo.

De la influencia nerviosa en el movimiento muscular.

Los nervios concurren activamente al movimiento muscular: son los agentes que determinan la contraccion de los musculos , esto es, el resorte de ellos dirigido por la voluntad.

¿ Los nervios que sirven á determinar la contraccion de los musculos son nervios motores diferentes de los sensitivos , comprendidos unos y otros en un mismo filamento hasta sus últimas ramificaciones , ó bien un nervio mismo es sensitivo y motor? Este es un problema difícil de resolver , no obstante se arriesgan las proposiciones siguientes.

1.^a Ligado el nervio de un musculo éste pierde el sentido y el movimiento: luego en un mismo cordon residen ámbas propiedades.

2.^a Los musculos se contraen á voluntad sin que las impresiones que mueven á ésta hayan sido transmitidas por los nervios de los musculos que se mueven , sino por los de los sentidos externos ó sensaciones interiores: luego para obrar la propiedad motriz no ecsige la operacion de la sensitiva, ni el estímulo impresionante debió obrar contra el órgano que se mueve.

3.^a Cada una de estas propiedades puede sufrir separadamente un trastorno sin que se resienta la otra como sucede en la parálisis imperfecta: luego son propiedades difentes que residen en un mismo nervio.

4.^a La impresionabilidad sensitiva es en razon directa de la movilidad: luego son propiedades pertenecientes á un mismo órden de la vida animal.

El modo de obrar de los nervios para el movimiento es absolutamente desconocido: el efectuarse artificialmente por la electricidad positiva y el suspenderse y agotarse por la negativa, ha dado motivo à creer que en los nervios reside un fluido motor de naturaleza electrica animal.

Sistema huesoso.

El sistema huesoso sirve de fundamento à toda la maquina; es el apoyo sólido de todas sus partes y determina la magnitud del cuerpo, sus proporciones, su forma y aptitud. Sin los huesos no podría el cuerpo guardar una forma regular y constante, ni podría mudar de sitio sino con mucha dificultad.

La consistencia de los huesos es debida à la sal calcarea interpuesta dentro las celdillas de su tejido. Conviene que esta sal no sea escedente ni defectuosa; porque si lo primero los huesos adquieren una fragilidad eccessiva como sucede en los viejos, y en algunas enfermedades conocidas; y si lo último se doblan sin poder suportar el peso del cuerpo como sucede en la requitis, y en los primeros tiempos de la infancia.

Parte fundamental del esqueleto

La parte fundamental del esqueleto es la columna vertebral porque le sirve de base, se el término de todos sus esfuerzos y como el centro sobre el cual los huesos se apoyan en sus diversos movimientos. La columna vertebral reúne una estrechada solidez y una movilidad bastante considerable: la primera pende de la longitud de las superficies articulares de las vertebrae, del volumen, de la longitud, de la direccion, de la fuerza de sus apófisis y de la multitud de los ligamentos y músculos que atan en ella; y la segunda pende del gran número de

piezas huesosas que entran en su formación, porque multiplicando los movimientos parciales de cada vertebra por el número de ellas resulta que sin embargo de ser poco el movimiento de cada una en particular, es muy considerable y general el movimiento total de la columna.

El tamaño y figura de los huesos debe ser relativo como veremos después al uso particular de cada uno; y su sustancia debe ser mas esponjosa en los parages en que deben presentar mas superficie, ó en que deben adherirse á los tendones, ó que han de ser mas elevados para servir de polea y punto de apoyo á las fuerzas musculares, tal es en las articulaciones las cuales partes son mas abultadas sin aumentar el peso. Las eminencias no articulares tienen la consistencia, figura y magnitud relativa al número de partes que deben insertarse en ellas, á la dirección de las fuerzas musculares que se les insertan, y á la intensidad de la misma fuerza.

El periostio membrana adherida á los huesos, sirve para conducir los vasos que se distribuyen en su sustancia y de contentivo para que no propase de sus límites la sal calcarea que se interpone en sus celdillas.

La medula ó tuetano de los huesos mas bien parece una prueba de la cantidad de humores del cuerpo, que el servir de medio para un cierto género de flexibilidad de los mismos. En efecto solo se tiene observado que la proporcion de la médula es constantemente relativa á la gordura, tanto por su naturaleza química como por sus usos.

Articulaciones.

Asi como la dureza de los huesos proporciona la estabilidad al cuerpo, las articulaciones son los cen-

tros en donde se fijan los movimientos particulares, siendo la direccion y dimension de las caras articulares proporcionadas á la estension, número y direccion de movimientos que deben permitir. Las articulaciones de movimiento de rotacion conviene que sean formadas por solo dos huesos, que el uno tenga una única cabeza y el otro una correspondiente cavidad que la reciba; cuando los movimietos deben ser de mucha estension conviene que sea superficial la cavidad articular como sucede en el humero con el omoplato; y cuando no han de ser tan estensos pero dirigidos sobre un punto, como el muslo que sin embargo de efectuar el movimiento de rotacion es mas estenso el de reflexion, conviene que sea la cavidad mas profunda, y el cuello del hueso con inclinacion hácia delante.

Las de charnela en que no se permiten mas que dos movimientos, de estension y flexion, de adduccion ó abduccion conviene que las articulaciones sean formadas por huesos que tengan cada uno eminencias y cavidades en su superficie articular, y que la articulacion sea inclinada hácia el parage en que debe ser mas estenso el movimiento que comunmente es el de flecsion.

Para que puedan efectuarse los movimientos, conviene que las articulaciones diartrodiales sean pulidas y lubricas por un hamor untuoso, que facilite resbalar las superficies articulares, Las ternillas articulares proporcionan la lisura al paso que sirven de almoadá á los extremos de los huesos, y la sinovia forma el unto que las mantiene lubricas.

Principios de mecánica necesarios para la inteligencia de los movimientos y posturas.

Línea vertical.

Se llama línea vertical aquella bajo la cual se egerce el peso de un cuerpo.

En cada posición del cuerpo, la vertical pasa por puntos diferentes; pero hay un punto en que se cruzan todas las direcciones de esta fuerza: este punto se llama *centro de gravedad*.

La condición de *equilibrio* de un cuerpo ponderoso puesto sobre un plano horizontal es que la perpendicular que baja del centro de gravedad sobre el plano horizontal venga á caer entre los puntos ó límites en los cuales el cuerpo se apoya.

El equilibrio de un mismo cuerpo ponderoso sobre un plano horizontal es tanto mas estable cuanto el centro de gravedad del cuerpo es mas cerca del plano y que la superficie en que se apoya es mas extendida.

La base de sustentación es el espacio determinado entre los puntos en que el cuerpo se apoya sobre el plano.

De dos columnas cavas formadas de una igual cantidad de la misma materia teniendo una misma altura, la que tiene la cavidad mas considerable es la mas fuerte. De dos columnas del mismo diametro, pero de altura diferente, la mas corta es la mas fuerte.

El mayor peso que puede suportar un resorte que experimenta pequeñas flexiones, es proporcional al cuadrado del número de las flexiones mas uno, al paso que si el resorte presenta tres corvaduras suportará un peso diez y seis veces mayor que sino presentaba ninguna.

Palanca es una línea inflexible que se mueve al rededor de un punto fijo. Se distinguen en cada palanca tres puntos, á saber, punto de apoyo, punto de pujanza, y punto de resistencia. Segun la posición respectiva de cada uno de estos tres puntos, la palanca es de primera, segunda, ó tercera especie,

En la de primera especie el punto de apoyo está entre la resistencia y la pujanza. En la de segunda la

Centro de gravedad.

Equilibrio.

Base de sustentación.

Resistencia de las columnas.

Palancas.

resistencia está entre la pujanza y punto de apoyo. En la de tercera la pujanza ocupa el medio entre el punto de apoyo y la resistencia.

*Brazo de la
palanca.*

Se distinguen en la palanca el brazo de resistencia y el brazo de la pujanza. El primero comprende la porcion de palanca que se estiende desde el punto de apoyo á la resistencia, y el segundo desde el punto de apoyo á la pujanza.

Cuando en la palanca de primera especie el punto de apoyo ocupa exactamente el medio de la palanca se dice entonces que la palanca es de brazos iguales: cuando el punto de apoyo se acerca mas á la resistencia ó á la pujanza se llama palanca de brazos desiguales. Si el brazo de la palanca que corresponde á la resistencia es el mas largo proporciona ventaja á la resistencia, y al contrario si es mas largo el de la pujanza la proporciona á esta. De todos modos la longitud del brazo de la palanca da mas ó menos ventajas tanto á la pujanza como á la resistencia.

En la segunda especie de palanca el brazo de la pujanza es necesariamente mas largo que el de la resistencia porque esta es entre la pujanza y el punto de apoyo. Este género de palanca es ventajoso á la pujanza.

En la tercera especie es la ventaja para la resistencia, porque esta ocupa un extremo y la pujanza ocupa el medio entre la resistencia y el punto de apoyo. La palanca mas favorable para el equilibrio es la de primera especie; la de segunda es favorable para vencer una resistencia, y la de tercera es la que mas favorece la rapidez y estension de los movimientos.

*Insercion de
las pujanzas
en las pa-
lancas.*

Es muy importante atender á la direccion bajo la cual la pujanza se inserta á la palanca. La fuerza de la palanca es tanto mayor cuanto su direccion se hace mas perpendicular á la de la palanca. De modo

que cuando tiene esta condicion absoluta la totalidad de la fuerza se emplea en superar la resistencia; mientras que en las direcciones oblicuas una parte de la fuerza se emplea para mover la palanca hácia su propia direccion, y esta porcion de fuerza es destruida por la resistencia del punto de apoyo.

Llábase *inercia* aquella propiedad general de los cuerpos por la que permanecen en su estado de movimiento ó de reposo, con tal que el modo de obrar de alguna causa estraña no embargue su estado provocando otro contrario.

Fuerza motriz.

La fuerza que produce el movimiento debe medirse por la cantidad de movimiento producido. Esta cantidad se estima multiplicando la masa por la velocidad adquirida. La velocidad puede adquirirse de dos modos diferentes, ó por la accion continua de una fuerza, como de la ponderosidad; ó por el efecto de una fuerza que produce instantaneamente una prontitud perfecta.

De lo dicho se deduce que todo esfuerzo que obra sobre un cuerpo libre producirá un movimiento. La direccion de este movimiento, la velocidad adquirida, y el espacio que habra corrido el cuerpo dependerán de su masa, del esfuerzo, de la intensidad, de la accion aplicada contra el, y de las fuerzas que le escitan durante su movimiento.

Causas que influyen para el movimiento.

Se llama roze la resistencia que se encuentra al tiempo de hacer resbalar un cuerpo sobre otro. *Adhesion* se llama la fuerza que une dos cuerpos lisos aplicados uno sobre otro. Esta fuerza se mide por el esfuerzo que se egerce perpendicularmente á la superficie de contacto para separar los dos cuerpos. Cuando mas pulidas son las superficies, es tanto mayor la adesion, y menor el roze. Si esas superficies pulidas son lubricas es menor la adesion y mas facil el roze.

Roze y adhesion.

Fuerza de los músculos; ventajas y menoscabos que experimenta en el movimiento voluntario.

La fuerza efectiva de los músculos es muy considerable y aumenta en razon á las resistencias que se le oponen.

Esta propiedad como tenemos dicho es siempre relativa al número de las fibras carnosas que entran en su composicion; por esta razon exigen tener mas fibras aquellos músculos que deben superar grandes resistencias. Esta multiplicacion hubiera dado á los miembros un volumen demasiado considerable, si la naturaleza no hubiera hecho mas cortas las fibras aproximando sus puntos de insercion que siempre se verifican en superficies muy estensas ya aponeuróticas ya huesosas; de modo que en general se puede juzgar de la fuerza del musculo por la estension de las superficies donde se implantan las fibras carnosas.

Queda dicho que la estension de los movimientos es relativa á la longitud de las fibras que es lo mismo que decir al grado de encogimiento de que son susceptibles las fibras de un musculo. Pero este encogimiento no debe valuarse por cada fibra en particular, sino por la totalidad de la longitud del musculo.

Menoscabos de la fuerza muscular.

Una gran parte de la fuerza muscular se inutiliza por la disposicion desfavorable de los órganos del movimiento. En efecto las potencias musculares estan casi siempre paralelas á los huesos que deben mover, de que resulta que una gran parte de fuerza se pierde por la resistencia que ofrece su punto de apoyo.

Otro menoscabo.

A mas la mayor parte de los musculos se implantan á los huesos muy cerca de sus articulacio-

nes ó del centro de sus movimientos constituyendo una palanca de tercera especie que ofrece siempre ventajas à la resistencia, y en nuestros movimientos mucho mas, porque queda muy largo el brazo de la resistencia. Esta disposición ha sido muy oportuna porque al paso que ha disminuido la fuerza de los musculos ha aumentado las velocidades; pues insertada la potencia muy cerca del punto de apoyo y dejado por lo mismo muy largo el brazo de resistencia, ha bastado para que con poca contraccion muscular corriese grande distancia el brazo de resistencia ó el miembro movido.

Parte de la fuerza de las fibras no es directa al *Otro.* punto de insercion, porque se implantan en los tendones oblicuamente.

Los musculos que pasan sobre muchas articulaciones, pierden una parte de su fuerza en el juego mas ó menos libre que egecutan unas sobre otras las diversas piezas sobre las cuales se apoya el hueso donde se insertan. *Otro.*

Sin embargo que los musculos son bastante paralelos á los huesos, y que por lo mismo sus fuerzas deben experimentar una rebaja relativa á su paralelismo, con todo la naturaleza ha disminuido este estado con separar los tendones de la direccion de los huesos aumentando los ángulos bajo que se insertan; efecto que ha producido colocando en su camino huesos que hagan mudar la direccion, v. g. la rotula; ó bien que es lo mismo dando á los extremos articulares de los huesos un mayor volumen; ó por fin colocando poleas de retorno sobre las cuales los tendones ó musculos se reflegan mas ó menos como sucede en los contornos del velo palatino, los obturadores internos etc. *Ventajas.*

De todo lo dicho se infiere que si bien la palanca de tercera especie se halla con mas frequen-

cia empleada en la economía animal y que por lo mismo sufre desventajas la fuerza del movimiento, ha obrado lo mejor porque ha consiliado con esto la mayor agilidad posible, condicion que para nuestro modo de ecsistir necesitamos mas que la fuerza.

Las otras dos palancas no estan enteramente des-
terradas de la economía animal: así tomando el pie por egemplo, nos presenta palancas de toda especie. Estirado el pie y suspendido en el ayre, forma una palanca de primera especie; porque el punto de apoyo es en la articulacion, colocado entre la pujanza que se halla en el talon y la resistencia que es la punta del pié: forma una palanca de segunda especie cuando nos mantenemos derechos sobre la punta de los pies; porque entonces la resistencia es el peso del cuerpo que carga sobre la articulacion del pié, y se halla colocada entre la pujanza que es en el talon, y el punto de apoyo que es en la punta de los pies: cuando doblamos el pie sobre la pierna, forma una palanca de tercera especie; porque en este caso la pujanza, que son los músculos flecsores del pie, se halla colocada entre el punto de apoyo que es la articulacion, y la resistencia que es la punta del pie.

En los movimientos del cuerpo lo que es punto fijo puede pasar á punto movil; así es que cuando doblamos el múslo este es el punto movil y la pelvis el punto fijo; pero cuando estando en pie doblamos el cuerpo hacia delante, el punto fijo es el múslo y la pelvis el punto movil.

Una armazon tan complicada de articulaciones como es el esqueleto que sirve de estabilidad á los movimientos ecsige muchas veces la accion simultanea de diversas fuerzas distantes para efectuar un solo movimiento: v. g. cuando estando echados queremos levantar la cabeza, se ponen en accion los

musculos del abdomen, los gluteos, los gemelos etc. de modo que resulta un movimiento muy complicado.

Cuando dos músculos antagonistas de igual fuerza obran al mismo tiempo sobre una parte igualmente movable en todos los sentidos, las fuerzas de ámbos se destruyen reciprocamente y la parte queda inmóvil. Si se contraen en diversos grados, la parte se dirige hacia el músculo que mas se contrae; si el antagonista no es directo sigue una direccion media entre la de las potencias que la mueven,

Corolario.

Las articulaciones pueden mirarse en general como punto de apoyo; los músculos se atan por un extremo al hueso que ha de moverse y por el otro al hueso que forma el apoyo pasando el músculo sobre la articulacion siempre mas abultada que lo restante del hueso, lo que hace formar una inflexion al músculo y le ofrece una ventaja sobre el menoscabo que debia experimentar por la direccion mas arrimada al paralelismo.

Los músculos se hallan atados al hueso que han de mover muy cerca de la articulacion punto de apoyo, y por esto al paso que se debilita la fuerza del músculo se aumenta el espacio que puede correr el hueso.

El movimiento se efectua cuando la voluntad determina una cantidad de principio motor al músculo que ha de contraerse, por medio de los nervios.

Llamamos movimientos de *locomocion* aquellos por los cuales mudamos de sitio, y movimientos *parciales* los que sirven para cambiar la posicion reciproca de las partes del cuerpo: v. g. los movimientos de la cabeza, de la cara, de los brazos, del tronco etc.

No trataré en particular de las posturas y movimientos parciales por no ser proporcionado al objeto de elementos sucintos que me he propuesto, debiéndome limitar á las generalidades. Es constante que las posiciones y movimientos penden de la acción muscular formando palancas bajo las reglas esplicadas.

De la voz.

Es un sonido producido en el larinx al momento que el aire atraviesa sea este órgano sentrando ó saliendo. El larinx pues es el órgano de la voz: aúgereada la traquea por debajo del larinx hace perder absolutamente la voz, y la buena disposición de sus partes procura la perfección de este sonido.

El sonido es mas ó menos agudo ó grave segun que los cartilagos aritenoides seán arrimados el uno al otro con mas ó menos fuerza, y será tanto mas intenso el sonido cuanto mas fuerte sea el paso del aire. El sonido parece producido por las vibraciones del ligamento inferior de la glotis.

Mecanismo.

El aire espelido de los pulmones camina á lo largo de un canal bastante ancho, que al fin se estrecha, y es obligado á pasar al través de una lengüeta cuyos dos lados son dos laminas vibrantes, los aritenoides, que á la manera de las laminas de las fistolas de musica le permiten é interceptan el paso, y que por sus alternativas deben determinar otras tantas undulaciones sonóras en la corriente del mismo.

Para surtir el efecto conviene estén en contrac-

cion los musculos tiro-aritenoideos; pues sin ello los ligamentos de la glotis no pueden vibrar: por esto en la parálisis de dichos musculos se halla enteramente perdida la voz.

La intensidad de la voz lo mismo que de los demas sonidos, depende de la estension de las vibraciones: aquellos hombres vigorosos de pecho ancho, cuyo larinx adquiere grandes dimensiones tienen la mejor disposicion para la intensidad grande de la voz; porque con cuanta mas fuerza sale el aire mas vibraciones tendrán las cuerdas vocales y serán estas mas largas, esto es, será mas voluminoso el larinx y por esto tendrán mas estension las vibraciones.

*Intensidad
de la voz.*

Los infantes, las mugeres, y los eunucos cuyo larinx es proporcionalmente mas pequeño que en el hombre adulto, tienen la voz tambien menos intensa.

En la produccion ordinaria de la voz, esta resulta de los movimientos simultaneos de ámbos costados de la glotis; si el uno por tanto pierde la facultad de vibrar, la voz pierde la mitad de su intensidad.

Cada individuo tiene su timbre de voz particular por el que se da á conocer y diferencia de los demas; de modo que son tantas las modificaciones del timbre de la voz cuantos son los individuos que la poseen. Se cambian tambien por la edad y el sexo.

Timbre.

El larinx representa un tudel ó fistola à doble lamina en que los tonos son tanto mas agudos cuanto las laminas sean mas encogidas, y mas graves cuanto mas largas.

*Tonos de la
voz.*

Concurren á la modificacion de la voz todas las partes comprendidas en el augero vocal compuesto; 1.^o del intervalo que corre desde el epiglotis ade-

lante, sus ligamentos laterales etc; 2.º del farinx hácia atrás y lateralmente, y de la parte posterior de la base de la lengua adelante; 3.º la boca y cavidades nasales junto y separadamente. Las principales modificaciones de la voz son la voz nativa ó grito, la voz propriamente dicha ó adquirida, la palabra ó voz articulada, y el canto ó voz apreciable.

Grito.

El grito es un sonido inapreciable, susceptible de variar, como los demas del larinx de tono, intensidad y timbre. Se distingue de todos los demas sonidos de la voz: á su beneficio esprimimos las sensaciones vivas venidas de afuera ó de dentro, sean agradables ó desagradables. Por el grito señalamos las necesidades instinctivas y las pasiones naturales. Por fin hay grito de furor, grito de temor etc.

El grito ordinariamente supone los sonidos mas intensos que puede formar el órgano de la voz.

Por medio del grito el hombre establece relaciones las mas transcendentales con sus semejantes; el grito de alegría dispone al gozo; el grito de dolor escita á compasion; el grito de terror conduce al terror hasta á los que están á grandes distancias etc.

Voz adquirida.

La voz adquirida es un sonido de voz modificada por el hábito de oír á sus semejantes. Es creible que si el hombre estubiese desde su infancia incommunicado continuaria egerciendo su voz nativa, y con gritos espresaria querer imitar á sus semejantes; les observa pues para imitarles, porque conoce ventajas; lo consigue y he aqui la voz adquirida. Un sordo de nacimiento que no puede hacer tales observaciones continúa manifestando sus deseos con el grito ó voz nativa. Esta no difiere del grito por la intensidad y el timbre; pues es tambien un sonido inapreciable, esto es la voz nativa educada.

Por la misma razon de ser educada es diferente en casi todos los países.

La *palabra* no es mas que la voz articulada, y *De la palabra* de consiguiente es una modificacion de la voz; lo mismo puede decirse del canto.

Un idioma se compone de palabras y estas son *Mecanismo de las palabras* los signos de las ideas; las palabras se forman de letras ó de los sonidos del alfabeto que por lo comun son modificaciones de la voz.

Las letras se dividen en unas que son verdaderas *Letras* modificaciones de la voz, y otras que pueden ser formadas independientes.

Las que pertenecen á la voz en España son *Vocales* á é í ó ú.

Las hay vocales labiales la *b*, y la *p*: dentales *Labiales* *d*, *t*: palatina la *l*: consonantes guturales *g*, *k*: nasales *m*, *n*. Las independientes son la *f*, *v*, *z*, *s*, *r*, *Independientes de la voz* *x*, *h*. La voz en estas no contribuye mas que para transmitir el sonido de ellas á mas distancia.

Para la pronunciacion se necesita una buena disposicion de todas las partes que componen la cavidad *Pronunciacion* bucal de modo que el trastorno de alguna la produce imperfecta, porque como esta no consiste mas que en la aglomeracion coordinada de todas las letras, faltando una parte de las que componen la boca no podrá unirse á las demas letras la que dependa de la perfeccion de ella. Si por exemplo falta el labio, no podrá unirse á la pronunciacion la *p*, *b*, ect., si los dientes la *t*, *d*, ect., y asi de las demas partes.

La *voz baja* se forma por el solo ruido que forma el aire atravesando el larinx; pero que para egercerse bien exige educacion. *Voz baja.*

El hablar se diferencia del articular, y pronunciar en que aquel es dirigido por la inteligencia, y estos penden del solo hábito: asi es que el Loro articula y pronuncia, pero no habla. En fin el hablar *Palabra.*

es esclusivo al hombre; pues el solo da con la palabra la señal de su idea.

Canto. El canto es producido por sonidos apreciables, esto es, de sonidos cuyos intervalos, intensidad, y modificaciones las distingue bien el oído. El canto puede ser simple y articulado; uno y otro agudo y grave, sencillo y combinado ect.

Mudez. La *mudez* es la imposibilidad de hablar; puede ser de nacimiento y accidental; la de nacimiento puede ser por vicio en la boca, como falta de lengua, y se llama *mudez directa*; y por ser el infante sordo, y se llama *secundaria ó indirecta*: esta es la mas frecuente. En la *mudez* se conserva la voz, esta es *nativa* si la *mudez* es efecto de sordera, y *adquirida* si el mudo tiene oído.

Tartamudez La *tartamudez* es un vicio en la pronunciación, por el que no pueden desprenderse las palabras como son en sí. Supone vicio en los órganos de la boca; puede ser *natural y accidental, absoluta y temporal*.

Gastrimismo Se llaman *gastrimismos* aquellos que tienen la facultad de dar al sonido de su voz diferentes timbres y tonos seguidos; y han tomado el nombre de *ventrílocos* porque parece algunas veces que su voz sale del vientre; pero nada de esto, el hombre que puede variar al infinito los sonidos apreciables de su voz, cambia de muchos modos la intensidad, el timbre etc. y lo hace solo con imitar los tonos que hieren su oído; por esta razón cuanto mas instruido y perspicaz es el *ventríloco*, sabe proporcionar mayor número de modificaciones á su voz. La voz del *ventríloco* es formada del modo ordinario, y si bien habla algunas veces una conversacion seguida sin mover los labios, hay que advertir dos prevenciones que el no descuida; asaber hacer el razonamiento de palabras en que no entren *bocales labiales*, y en caso de deber entrar

alguna disimular el movimiento de los labios en bajar la cabeza un momento, con rascarse la nariz, volver un poco la cabeza etc.

El arte de los ventrílocos adquiere mayor grado de perfeccion si el actor manifiesta sus habilidades en teatro arreglado al intento. El ventríloco procura muchas de las ilusiones acústicas modificando la voz en el larinx; pero para ello es preciso mucho hábito, y buen oído. *Modificaciones por la edad.*

Los recién nacidos tienen un gríto particular bien conocido de todos, de manera que con el se distingue facilmente de otro que tenga un año. *Gritos del recién nacido.*

En lo restante de la vida experimenta algunas modificaciones entre las cuales ninguna mas sensible que la que sucede en la pubertad de que se ha hablado tratando de esta época.

Sueño y vigilia.

Después de haber hablado del sentido y movimiento que forman las funciones relativas, parece que corresponde tratar de la interrupcion de ellas á que por intervalos estamos obligados. Esta interrupcion se llama *sueño* que puede definirse el reposo de los órganos de los sentidos y movimientos voluntarios. Las funciones asimilativas no se interrumpen con el sueño, la digestion, la absorcion y la nutricion se efectúan con mas energía; pero la respiracion, la circulacion y sobre todo las secreciones experimentan algun retardo. En efecto la digestion y absorcion son muy activas durante el sueño, (por esto hay tanto peligro en dormirse en parages mal sanos) mientras que el pulso es mas lento y débil, las inspiraciones son menosfrecuentes y todos los humores emanados de la sangre son segregados en menor cantidad; en una palabra las fuerzas se concentran durante el sueño.

El sueño puede mirarse como [el reparador del principio sensitivo y motor gastado por los órganos de los sentidos y movimientos durante la vigilia; por esto conviene que el sueño presente una duracion relativa á la del egercicio.

Hasta los órganos de las funciones mas esenciales á la vida experimentan intervalos de reposo, pero son muy cortos, al paso que en los de las funciones relativas conviene que sean prolongados el reposo y egercicio; pues es fácil el juzgar los inconvenientes que hubiera tenido el no poder mantener las funciones de relacion en egercicio permanente.

Duracion.

La duracion del sueño es de la tercera á cuarta parte del dia, no obstante los niños duermen mas y por lo contrario los viejos duermen menos.

El ser el sueño mas prolongado en los niños puede atribuirse á la prodigiosa actividad digestiva que llama al interior las fuerzas de la vida, y al hábito que tienen al sueño; pues en este estado han pasado los nueve primeros meses de su vida, y á la verdad que los niños duermen mas cuanto mas cerca están de su nacimiento. El sueño dista mucho de la muerte con la que se ha querido comparar; pues que en él no hay mas que una suspension de funciones relativas, pero en la muerte cesan estas y las asimilativas.

Causas que hacen conciliar el sueño.

El sueño se consigue con faltar las causas excitantes de nuestros sentidos; por esto se consilia mejor con el silencio y oscuridad. El olfato, el gusto y el tacto se ponen del todo inertes con el sueño; la vista y el oido tranasmiten aun débiles impresiones; y los sentidos internos dejan de obrar

Causas que lo interrumpen.

del todo. Todo lo que escita al cerebro interrumpe el sueño, y se opone á conciliarlo; y al contrario lo favorece la sustraccion de estas causas.

Las causas artificiales del despertar son las que obran escitando los sentidos como el ruido, una luz viva, el tocar el cuerpo, la acumulacion excesiva de materiales en sus receptaculos que transmiten la impresion al cerebro etc. La causa natural de despertarnos es el cúmulo de principios sensitivo y motor (electrico animal) en el cerebro, y el hábito que tiene un notable influjo sobre este fenómeno así como sobre todos los del sistema nervioso. Así es que muchos acostumbrados á dormir en medio del ruido no pueden conciliar el sueño sin el, y despiertan si se interrumpe. La voluntad influye tambien para el despertar, pues basta quererlo para lograrlo en hora destinada.

Los sueños pueden considerarse como un estado intermedio entre el sueño y la vigilia pues en ellos algunos de los sentidos parecen hallarse en su actividad. Son reproducciones que hace la imaginacion al cerebro de ideas experimentadas, pero que estas trabaja y convina mal porque no hay la anuencia de los demas sentidos, cuya accion debe ser uniforme para la formacion del juicio.

Sueños.

La accion tumultuaria del cerebro obra tambien à veces sobre los órganos de los movimientos por solas impresiones anteriores, provocandonos à andar, hablar y à otras cosas asombrosas que se cuentan del *somnambulismo* que así llaman á esta especie de sueños. Los *somnámbulos* no son advertidos por sus sentidos de las cosas presentes si solo de las recibidas durante la vigilia.

Somnambulismo.

Tambien algunas veces un sentido queda abierto á las impresiones de los cuerpos que le afectan hasta poderse dirigir al arbitrio el trabajo intelectual. Así es que se hace conservar al que sueña una conversacion obligandole à publicar sus mas secretos pensamientos. La disposicion de los órganos influye mu-

cho acerca la naturaleza de las cosas que soñamos. La sobreabundancia de licor seminal hace soñar cosas licenciosas: en las idropesias los enfermos sueñan rios y fuentes etc.

De las funciones asimilativas.

Llamanse funciones asimilativas porque todas tienden á preparar la materia que ha de asimilarse é identificarse con los órganos: el conjunto de ellas constituye la vida vegetativa. Sin embargo que estas funciones se hallan encadenadas sin interrupcion hasta poderse considerar como una sola, cuyo objeto es separar de los alimentos la materia nutritiva y prepararla por medio de reactivos volviendola á proposito para la nutricion; con todo para volver más fácil y comprensible el estudio de ellas, las dividiremos en *digestivas* destinadas á separar la materia nutritiva, prepararla, y animalizarla; *absorbentes* cuyo encargo es absorberla, y unida con otras substancias, la *límfa*, abocarla despues de haber sufrido alguna alteracion, al torrente general de la sangre; *circulatorias* destinadas para presentarla á los pulmones en donde mediante el aire atmosferico recibe la preparacion mas importante la *sanguificacion*, á los órganos secretorios para un nuevo espurgo, *secreciones*, y á todas las partes del cuerpo para su *nutricion*; y *nutritivas* residentes en todas y cada una de las moléculas orgánicas. Estas últimas pueden mirarse como el complemento de todas las demas, consisten en elegir de la sangre la parte que á cada una corresponde asimilandola á su propia naturaleza y compensar de este modo las pérdidas incesantes que sufren.

Funciones digestivas.

La primera de estas funciones es la de triturar, disolver y preparar los alimentos en la boca, *la masticacion y disolucion salival*. La 2.^a es en el estómago, *digestion estomacal*, con esta se preparan nuevamente y transforman en una masa uniforme que contiene la materia nutritiva animalizada y con independendencia de la no nutritiva. La 3.^a en el duodeno en donde se separa la una de la otra mediante el humor bilioso-pancreatico que sirve de reactivo, *digestion duodenal*. La 4.^a la de los intestinos delgados, que por la demora que experimenta en ellos la pasta alimenticia, se favorece la separacion; esta es en algun modo continua á la antecedente. La 5.^a la de amoldar y retener los excrementos en los intestinos gruesos. La 6.^a la espulsion de las hezes ventrales por el ano.

Antes de empezar las funciones digestivas conviene tratar de los alimentos y bebidas.

Alimentos y bebidas.

Lllamanse alimentos todas las substancias que pueden servir para la nutricion; las hay que pueden servir solas y se sacan de los animales y vegetales, y otras que no pueden servir sin el concurso de las primeras, son los del reyno mineral y forman los condimentos.

Las sustancias animales contienen mas materia nutritiva bajo un mismo volumen que los vegetales; por esta razon los hervívoros tienen mas grande y dilatado el tubo digestivo porque tienen necesidad de ingerir mayor volumen de alimentos que los carnívoros en igualdad de circunstancias. Las car-

nes tiernas son menos nutritivas que las añejas porque su gelatina no obstante de ser mas abundante es menos consistente.

Tambien son las carnes mas faciles de digerir y por esto los hervivoros no solo tienen su tubo digestivo mas grande sino que mas enérgico, porque necesita obrar con mas fuerza; y mas largo porque conviene que el alimento permanezca en él por mas tiempo.

De los vegetales se toman los alimentos *harinosos*, *mucilaginosos*, *azucarados*, *acidulos* y *oleosos* ó *grasientos*. Los harinosos nutren mucho y mas si son fermentados.

De los animales los *lacticinios* ó *caseosos*; *gelatinosos*, como los tendones, tejido celular, animales muy tiernos; *albuminosos* como el cerebro, nervios, huevos etc., y *fibrinosos* como la carne y la sangre.

Las bebidas son nutritivas por si solas cuando son cocimientos de sustancias animales ó vegetales, pero nutren menos que los alimentos sólidos ó blandos. Las bebidas propriamente dichas sirven para facilitar la disolucion de los sólidos. Se dividen en simples, fermentadas y espirituosas. Las simples son el agua que tiene la mayor propiedad de disolver los alimentos, el agua es tambien estimulante del estómago por el aire y sales que contiene, por esto el agua destilada es menos á proposito. Las fermentadas son las diferentes tisanas: estas y las antecedentes se llaman *aquosas*. Las espirituosas son el vino y alcooles; estas sirven mas para escitar que para disolver; pero entre ellos el vino es mas disolvente que los alcooles porque tiene mas agua; los ultimos condensan el moco de que se infiere que no podrán convenir à los hombres secos y cuyos humores son espesos.

Del hambre y de la sed.

Son dos sensaciones que nos advierten de la necesidad de reparar las pérdidas que continuamente sufre nuestro cuerpo. Cuanto mayores son estas pérdidas es tambien mayor el hambre naturalmente ó en estado sano. Los jóvenes que tienen su vida orgánica mas activa son tambien los que experimentan mas estas sensaciones, y tienen necesidad de satisfacerlas mas á menudo.

El hambre y la sed son dos sensaciones instintivas orgánicas, y por tanto como todas las demas, ni se pueden definir ni conocer su causa próxima en el hombre ni demas animales.

En los animales de nervios son instintos animales orgánicos, esto es, toma en ellos gran parte el sistema nervioso; por esta razon tiene el habito grande influencia sobre ellos. Al experimentar estas sensaciones debemos satisfacerlas, pues al contrario pereceriamos. La sed es mas imperiosa que el hambre, es mas molesta y se aguanta menos; por esto la debemos satisfacer mas pronto..

Preparacion de los alimentos en la boca.

Consiste en triturar los alimentos, *masticacion*, y en impregnarlos de saliva, *disolucion salival*. Los alimentos duros son los que deben sufrir principalmente esta preparacion, los blandos la sufren menos, y los líquidos no la necesitan.

Todas las partes contenidas dentro la boca, y las continentes ó paredes concurren activamente à esta funcion.

Cuando queremos comer un alimento duro entra- *Mecanismo.*
mos en la boca un pedazo de él, ó bien lo cortamos

con los incisivos si no es muy duro como el pan por ejemplo, pero si mas duro lo arrimamos á un lado á la accion de los caninos y primeras muelas, y si muy fuerte á las muelas medias y posteriores, porque de este modo proporcionamos ventajosa la pujanza acortando el brazo de resistencia. *Véanse leyes de mecánica.*

El pedazo que queda en la boca es arrimado por los lados y punta de la lengua entre las filas de muelas las cuales le muelen resbalando unas sobre otras por la accion de los músculos de la mandibula inferior; mientras se efectúan los movimientos alternados de la mandibula el alimento se escapa adentro y afuera de entre las filas de dientes, pero las paredes laterales de la boca por fuera, y la lengua por dentro vuelven á arrimarlo cada vez, y cerrándose y frunciéndose los labios impiden que caiga por delante: de este modo se hace la trituracion.

Disolucion salival.

Mientras dura la masticacion los alimentos se reblandecen por una cantidad de saliva y moco que cola en la boca por los conductos escretorios de las glandulas salivales y mucosas. Las glandulas que dan mayor cantidad de saliva son las parótidas situadas por delante y debajo de las cavidades glenoideas de los temporales y desguasan en la boca por los conductos de Estenon.

La saliva se segrega con abundancia en el tiempo de la masticacion á causa del estímulo que producen los alimentos en las embocaduras de los conductos escretorios, estímulo que comunicado por irradiacion á las glandulas las provoca á mayor juego. A mas coadyuvan al aumento de secrecion los sacudimientos que reciben las glandulas por el movimiento activo de las partes vecinas, y sobre todo las parótidas por los del borde posterior de la rama y ángulo de la mandibula inferior.

La saliva es un líquido trasparente y viscoso formado poco mas ó menos de cuatro partes de agua y una de albumina; con las cuales hay disueltos fosfatos de sosa, de cal, y de amóniaco, y una pequeña cantidad de muriate de sosa. Como humor albuminoso apetece y absorbe oxígeno de la atmósfera que le hace formar espuma cuando se le agita.

Es un líquido estimulante y muy á propósito para penetrar los alimentos á los cuales da el primer grado de animalizacion.

La naturaleza de los alimentos se pervierte con esta impregnacion no pudiéndose dudar de su alteracion quimica aunque no es facil conocer el resultado exactamente.

La saliva es un menstruo de mucha utilidad para la digestion de los alimentos de modo que el desperdicio de ella es causa comun de las indigestiones. Si los alimentos sólidos no se impregnan de saliva en la boca no son bien dispuestos para sufrir la digestion estomacal, y por esto los que comen sin triturar son propensos á indegestos. *Utilidades.*

Cuando es bastante adelantada la trituracion y bastante íntima la penetracion salival, entonces la lengua barre con su punta las diversas partes de la boca, recoge todos los alimentos, y reunidos les coloca en su superficie superior. *Deglucion.*

Concluida ya esta recoleccion estruja el bolo alimenticio contra la bóveda del paladar, y encorvando su punta hácia arriba y atras, al tiempo que deprime su base ofrece al bolo un plano inclinado sobre el cual lo empuja de adelante atras para que pase el gástrico. Este es el primer tiempo de los tres de que consta la deglucion, es un movimiento bastante pronto y subordinado á la voluntad.

Pasado el gástrico se precipita repentina é involuntariamente á la faringe. La presencia del bolo en

la cámara posterior de la boca estimula todas las partes que toca y se ponen en contraccion involuntariamente; esta contraccion simultánea y multiplicada de todas las partes aprietan de arriba abajo con una prontitud casi convulsiva al bolo alimenticio obligándole á pasar hasta la parte inferior de la faringe. No obstante que la contraccion é inclinacion del plano es hácia abajo una porcion de alimento retrocederia y pasaria por las rimas nasales á la nariz si el belo del paladar remangado por la accion de sus músculos no se lo impidieren, ó volveria á la boca sino se arrimase fuertemente la lengua al paladar molle. Por otra parte no le es permitido precipitarse en la glotis porque es tirada arriba y adelante y forma una ligera corvadura que le hace mirar hácia abajo por la direccion simultánea arriba y adelante del hioides, larinx, y base de la lengua; este movimiento es sustituido por otro de las mismas partes hácia abajo y atras, y se empuja de este modo el bolo por detras para que sea mas rápido su descenso. Durante este movimiento de la deglucion no se respira y por esto conviene que sea rápido para que no se intercepte demasiado tiempo la entrada del aire en los pulmones. Tambien conviene que sea involuntario, porque si dependiese de la voluntad seria facil á cualquiera darse la muerte con solo procurar la permanencia del bolo frente la glotis.

De la precedente esposicion resulta cuan equivocado es que el epiglotis cerrandose sea el obstáculo de la entrada de los alimentos en el larinx en el acto de la deglucion. Este aserto es apoyado por la esperiencia de aquellos que no obstante de faltarles la epiglotis por alguna afeccion ulcerativa no sufren por esto este incidente desgraciado; solo puede suceder cuando se efectua una inspiracion convulsiva, como en una sorpresa; entonces la columna de aire

entrante puede con su rapidez y fuerza arrastrar consigo una porcion de alimento é ingerirlo en la glotis.

El tercer movimiento de la deglucion es el transito de los alimentos á lo largo del esófago. Es un movimiento lento é involuntario procurado por la accion del esófago; de modo que en este como en los dos precedentes no pasa el alimento por su propio peso, sino por la fuerza activa de los órganos que componen el trayecto de deglucion. El movimiento del esófago es vermicular muy parecido al intestinal.

Los dos primeros se hacen mas fáciles cuando el bolo es algo voluminoso y consistente, pero en el tercero debe adelgazarse la masa alimenticia porque el esófago es susceptible de poca estension orgánica, y por esto facilmente se atraganta en él un bocado duro causando vivos dolores por la presion que hace à los filamentos nerviosos, hasta obligarnos algunas veces á recurrir à la cirugia para desencajarle.

La deglucion es favorecida por el moco que barniza las partes con que roza el alimento. Los líquidos son deglutidos por el mismo mecanismo que los sólidos, y no es mas difícil la de aquellos que de estos como se ha creído.

Digestion estomacal.

Los alimentos que entran en el estómago se depositan en su cavidad para recibir otra de las mas principales preparaciones. A medida que se acumulan se va distendiendo esta entraña, al principio insensiblemente y sin fatiga, pero esta sucede á proporcion que la acumulacion es algo considerable porque entonces el volumen mayor que adquiere el estómago comprime las entrañas del vientre y pa-

Fenómenos mecánicos. redes del abdomen lo que dá inquietud con dolores, y comprimiendo tambien el diafragma dificulta la respiracion.

Al tiempo que aumenta de volumen muda de figura y posicion inclinandose hácia adelante la corbadura inferior por no permitirle la columna vertebral el dilatarse hácia atrás.

Estimulado el estómago por la presencia de los alimentos se rehace contra ellos y les oprime de modo que experimentarían un movimiento retrógrado à no ser mayor la resistencia ó fuerza peristáltica del esófago, ó penetrarían sin demora el piloro sino lo privase el cerco muscular que le circuye y cierra fuertemente.

Fenómenos internos.

A mas de los fenómenos mecánicos ó de compresion siempre relativos á la distension que sufre el estómago por la cantidad de lo ingerido, resultan otras sensaciones internas debidas á la sensibilidad de la túnica mucosa del estómago escitada por la naturaleza de los alimentos: estas son un sentimiento agradable ó placer que se experimenta de haber satisfecho la necesidad instintiva, y el de una nueva fuerza que por grados reemplaza al hambre ó à la debilidad general y mal estar que la acompaña. Cuando está ya el estómago suficiente lleno ó se halla bastante satisfecha el hambre, se experimenta cierta plenitud que llega á ser dolorosa, y una especie de aversion á la comida; y sino obstante esta advertencia instintiva se persiste en querer comer, la aversion se hace nauseosa.

Sinergia digestiva.

La sensibilidad del estómago es muy esquisita de modo que parece formar un centro de sensibilidad en donde concurren todas las fuerzas de la vida cuando es escitado por la presencia de los alimentos produciendo la *sinergia digestiva* ó movimiento concéntrico.

En el espacio indeterminado de tiempo que los

alimentos persisten en el estómago sufren la quimificación ó transformación en una materia propia de los animales que es el *quimo* humor denso, de sabor y olor agrios, que enrojece el papel de tornasol. Esta alteración no empiezan á experimentar la los alimentos hasta alomenos una hora despues de ingeridos; sin embargo en unos es mas pronto que en otros en razon á que sean mas fáciles de digerir. Las sustancias animales se digieren por lo comun mas pronto que las vegetales; y las hay de estas que atraviesan todo el canal intestinal sin sufrir alteración alguna, tales como las legumbres semillas etc.

Quimo.

Aunque el quimo manifieste constantemente las cualidades generales arriba dichas, con todo conserva algunas relativas á la naturaleza de los alimentos de modo que es facil diferenciar por ellas las especies de alimentos de que depende.

A pesar de que es muy cierta la alteración de los alimentos en el estómago es muy difícil comprender el modo como esta se efectua, ni atribuirle una denominación química que le pertenezca con propiedad; no obstante conocemos la necesidad de influir algunas causas, tales son la acción del estómago de que nace la sinergia digestiva, y la de los jugos gástricos y salivales que sirven de reactivo. Entremos pues á indagarlas.

Los alimentos entran poco á poco en el estómago, su presencia excita y provoca la sensibilidad viva del crecidísimo número de nervios que contiene, su movimiento se aumenta y acelera, se dirigen hácia él las fuerzas de todos los órganos formando un centro de flución siempre relativo á la fuerza del estímulo, y en su consecuencia la sangre y demás humores acuden en gran cantidad y se llena el considerable número de vasos que se distribuyen en su sustancia, se aumentan las secreciones de exsalación.

Quimificación.

y folicular de su tunica mucosa y se eleva la temperatura en su cavidad.

El movimiento del estómago es continuo alternativamente dirigido de derecha á izquierda y al contrario: así los alimentos contenidos estan en continua agitacion, lo que es muy á propósito para que puedan penetrarles los humores gástricos destinados principalmente á esta elaboración.

Humores del estómago.

Los humores del estómago son: el humor gástrico, folicular, y ecsalacion arterial: es muy difícil ó imposible determinar cual sea la naturaleza de estos humores por la dificultad de recogerlos puros ó sin ser unidos con residuo de los alimentos; pero ello es que en junto con la saliva y moco que han entrado con el bolo alimenticio y que colan continuamente forman un humor viscoso de naturaleza jabonosa al que se atribuye la virtud de alterar los alimentos y la de tener particular tendencia con la parte asimilable mientras sea coupetentemente disuelta; esta última condicion se cree de suma utilidad fundada en que si los alimentos no entran disueltos, aunque sean nutritivos, no pueden ser penetrados ni alterados en el estómago; de aqui se infiere la necesidad de beber comiendo á proporcion que los alimentos sean mas secos y el cuerpo menos cargado de humores.

A medida que se agitan los alimentos dentro del estómago se empapan de los humores gástricos y quedan intimamente penetrados, siendo el quimo el resultado de la convínacion de la sustancia asimilable de los alimentos con los humores gástricos. Esta operacion se verifica principalmente en la superficie estrerna de la pasta alimenticia en donde se ve asomar el quimo en forma de capas.

El orden con que se quimifican los alimentos no es precisamente el que guardaron para entrar, sino que como queda insinuado se digieren mas pronto á

proporcion que son mas faciles de ser digeridos ; parece que estos á beneficio del movimiento del órgano digestivo se asoman al exterior de la masa , y que los indigeribles ó mas dificiles de digerir se depositan en el centro en donde experimentan cierta incubacion preparatoria ; por este medio se explica porque un hueso ú otro cuerpo extraño sólido de figura irregular ingerido con los alimentos no ofrece daño sensible en el estómago ; pero esto mas bien debe atribuirse á la fuerza expansiva de este órgano que se opone rechazando el extraño del lugar do quiere se fije , no menos que á la mucha lubricidad de su túnica mucosa. Como se quiera , el quimo buscando la superficie de la masa alimenticia chorréa hácia el fondo del estómago.

No es bastante provada la ecsistencia de gases en el estómago durante la quimificacion ; es creible que en el estado sano son en poca cantidad , pero en ciertos dispépticos es muy abundante segun se desprende de los eruptos y regurgitaciones que acompañan á sus digestiones.

Puede creerse que la duracion de la digestion estomacal es diferente en cada individuo , y puede establecerse por regla general que es tanto mas pronta cuanto mas enérgica la vida , mas faciles de ser digeridos los alimentos , y mas bien preparados en la boca , con todo es muy raro que una quimificacion no sea verificada en cinco horas despues de una comida regular.

Se va depositando el quimo principalmente en *Usos del pí-* la parte hepática del fondo del estómago , y es lle- *loro.* vado en cada movimiento de izquierda á derecha hácia el piloro. Este parece abrirse en aquel movimiento , y cerrarse cuando le sucede el opuesto , pudiéndose inferir de aqui que el uso directo de la válvula del piloro es impedir la entrada á los mate-

riales del intestino al estómago en el movimiento de derecha á izquierda, y franquear el paso al quimo en el opuesto.

Estos movimientos se repiten muchas veces seguidas y cesan para reproducirse despues. Cuando el estómago está lleno el movimiento se limita en la parte pilórica y aumenta á medida que se vacía, hasta que al último de la quimificación se extiende á todo el estómago.

*Sensaciones
internas que
acompañan
á la quimifi-
cación.*

El hombre robusto apenas experimenta otras sensaciones que las mecánicas en la formación del quimo; pero si son débiles ó sus digestiones mas ó menos laboriosas son seguidas á proporción de la debilidad en la acción de los sentidos, de frio general con ligeros escalofrios, entorpecimiento de potencias intelectuales y propension al sueño; por fin las fuerzas vitales se concentran en el órgano laboratorio y abandonan momentaneamente á los demas.

A estos fenómenos generales se juntan al fin de la formación del quimo la producción de gases que salen por la boca, pesadez, calor, vaídos, y á veces la pirosis ó sentimiento de calor vivo en el esófago producido por dichos gases en su salida.

- Digestion duodenal.

Se deduce de lo dicho que el paso de la pasta quimacea en el intestino duodeno no es seguido antes bien interrumpido. Se acumula dentro del mismo le estimula y distiende, se aumenta su movimiento para obrar sobre lo contenido y le obliga á pasar adelante á lo largo de los intestinos delgados no obstante de quedar el material acumulado en mayor cantidad en el primero. El movimiento de estos intestinos es análogo al del estómago, forma como este un movimiento undulatorio vermicular alternativo.

La mucha dilatabilidad de los intestinos delgados, y sobre todo del duodeno proporciona el acúmulo de una cantidad considerable de pasta quimácea en su cavidad, así como las escabrosidades que forman las valbulas en su interior y las muchas circunvoluciones intestinales retardan su curso. Por fin esta última circunstancia y la estremada longitud del conducto favorecen la permanencia del quimo en el mismo con que recibe oportunamente la preparacion intestinal.

Antes que el quimo llegue á unirse con la bilis y suco pancreático conserva siempre unas mismas cualidades; pero luego que se mezcla con ellos cambia su color en amarillento, su sabor en amargo, y disminuye su olor agrio. Se presenta en forma de puches parduzcas que adieren á las paredes de los intestinos espesándose á medida que se acercan á los intestinos gruesos; entonces su color amarillo vuelve mas oscuro hasta que al fin adquiere un color verdoso, y esto hace que el ileon tenga su color diferente del que presenta el duodeno y yeyuno.

Cambio que experimenta el quimo en los intestinos delgados.

Los cambios que experimenta el quimo en estos intestinos son variables segun la naturaleza de los alimentos; pero las sustancias que han resistido á la accion del estómago atraviesan el conducto intestinal sin sufrir alteracion alguna. Durante la elaboracion suelen producirse gases por el hidrógeno, carbono, oxígeno y azoe. El quimo en los intestinos delgados se transforma en quilo por la accion de los humores bilioso-pancreático y mucoso intestinal sobre el mismo quimo: es una verdadera conbinacion sin que nos sea posible conocer el modo de efectuarse.

Parece que estos humores se dividen en dos partes; una que se combina con la parte asimilable del quimo para formar el quilo, y otra se mezcla con los

escrementos, les mantiene agregados, y les da un poder estimulante de los intestinos que facilita su curso á lo largo de este conducto.

El quilo es un humor blanco, dulce, y de consistencia lactea. La bilis es un humor amarillo, viscoso, aceitoso, amargo y de consistencia mediocre, se segrega en el higado, se retiene en la vegiga de la hiel, y avoca en el duodeno por el colidoco. El humor pencreático es muy semejante á la saliva. De ellos hablaremos tratando de su secrecion respectiva.

*Accion de los
intestinos
gruesos.*

Los intestinos gruesos llamados asi porque son mas anchos que los delgados difieren tambien de estos en que el diámetro de su cavidad se halla interceptado en varias partes por fajas musculosas circulares separadas. Las partes de ellos destituidas de fajas son mas dilatables y es en donde se acumulan las materias fecales. El recto parece estar desprovisto de ellas y su túnica muscular mas espesa y uniformemente distribuida goza de una fuerza mas enérgica. La túnica mucosa de los intestinos gruesos no es escabrosa ni tiene tantos vasos absorbentes. En su union con los delgados hay una valvula, *ileocolica*, de tal manera dispuesta que permite el paso de los materiales hácia los gruesos y se opone al regreso desde estos á los delgados.

Los movimientos del ileon determinan la acumulacion de los materiales en el ciego en donde toman el nombre de *fecales* ó *escrementicios*: desde aqui pasan al colon cuyo trayecto siguen por la accion del propio intestino formando á veces una masa continua, y otras grupos ó pequeñas masas aisladas.

Ayudan á este tránsito la presion muscular abdominal, y la lubricidad de la túnica mucosa intestinal.

Cuando el material llega al recto se acumula en

el y distiende uniformemente sus paredes, porque los esfínteres del ano que tienen cerrado habitualmente dicho intestino se oponen á su salida continua. La consistencia de las heces es muy variable; ordinariamente se ponen mas espesas á medida que se acercan al recto; pero se reblandecen enpapandose con los humores que aqui se segregan.

Antes de entrar en los intestinos gruesos ningun olor fétido despiden propio de los escrementos humanos; pero adquieren este color por poco que se detengan en ellos; su color bruno amarillento adquiere tambien un tinte mas oscuro; y todas sus propiedades de consistencia, color, olor, composicion, cantidad etc. presentan muchas variedades relativas á la naturaleza de los alimentos digeridos, modo de efectuarse la quimificacion y quilificacion, y á la disposicion habitual y actual.

Entre los escrementos se encuentran las materias que no han podido ser digeridas como semillas etc. Mientras permanecen los escrementos en los intestinos gruesos se desprenden gases que contienen á proporciones variadas azoe, ácido carbonico, hidrógeno carbonado y sulfurado.

Cuando hay acumulada una cantidad suficiente de escrementos en el intestino recto la distension que este experimenta causa un sentimiento de plenitud en el abdomen que creciendo hasta hacerse muy vivo nos advierte y obliga á desembarazarnos de ellos, bien que su consistencia modifica la vivacidad de estas sensaciones.

Escresion de las heces.

Concurren principalmente para la espulsion de las heces el diafragma y músculos abdominales: la accion del recto y colon mas sirven para advertir la necesidad y conmover por irradiacion á los primeros que para vencer la resistencia del esfínter. Cuando pues escitado el intestino recto por la cantidad ó cali-

dad de las materias fecales comunica su estímulo al diafragma y músculos del abdomen que se ponen en acción simultánea para apretar las entrañas del vientre con inclinación hacia la salida de la pelvis. Este esfuerzo favorecido por una inspiración sostenida, y por la inclinación casi automática del cuerpo hacia delante, vence la resistencia de los esfínteres, se dilata el ano y salen entonces los excrementos por casi sola la acción del recto. Desocupado ya en gran parte cesan de obrar las fuerzas principales, se contraen los esfínteres y queda el ano cerrado hasta nueva necesidad.

La fuerza que debe emplearse para la expulsión es relativa à la consistencia de las heces. Las épocas de la expulsión son variables en razón à la cantidad y naturaleza de los alimentos, à la disposición individual, y al hábito: por este se rige de cuerpo à hora determinada, prueba de su grande influjo acerca esta escreción.

Las mugeres son ordinariamente mas tardas que los hombres debiéndose en ellas no pocas veces recurrir à medios particulares como ligeros purgantes, lavativas etc.

La expulsión de los gases ó ventosidades al paso que se efectúa comunmente por la sola acción del intestino recto, conviene con todo muchas veces la contracción de las paredes abdominales para determinar su salida. El uso de ciertos alimentos como farináceos, verduras etc. influyen bastante sobre la formación y la necesidad de espeler los gases.

Modificaciones de la digestión.

Los infantes digieren con mas prontitud los alimentos porque tienen su fuerza digestiva mas activa, pero como es menos estable y resistente solo pueden digerir alimentos de facil digestión; por lo que deben naturalmente comer mas á menudo, y sus alimentos deben ser tanto mas digeribles y animalizables cuanto

mas próximos están ó menos lejanos del tiempo de su nacimiento. Como no están provistos de órganos masticatorios conviene que sus alimentos sean líquidos, y que se les vayan proporcionando sólidos gradualmente á proporcion que se desarrollen estos órganos. Tienen el movimiento peristáltico intestinal mas acelerado por su mayor escitabilidad, y por ello la espulsion de las heces ventrales es mas frecuente.

Los viejos son mas lentos en digerir y escretar por la obtusion de la sensibilidad orgánica y animal; conviene que sus alimentos sean escitantes y blandos al mismo tiempo que abundantes de líquidos por la falta de órganos masticatorios y de humores. En todas edades el órgano digestivo es el que tiene mas relaciones con todos los demas del animal, pero siempre mas enérgicas con el cerebro y la piel.

Absorcion y curso del quilo.

La absorcion es una funcion confiada á un sistema de vasos llamados absorventes que originados de todas las partes del cuerpo y distribuidos por todos los órganos forman una parte integrante bastante considerable del cuerpo de los animales. Sus embocaduras son dotadas de una fuerza particular que atrae las partes sútiles puestas en contacto con ellas. Entre los vasos absorventes los hay destinados á absorber sustancias venidas de fuera, como son los del canal digestivo que absorben el quilo, los de la piel que chupan las sustancias que contactan con ella y los de la boca y pulmones que absorben ciertas sustancias unidas al aire y tal vez sus principios: otros destinados á llevar los humores que despues de haber servido para lubricar membranas han recibido una preparacion útil que los vuelve nutritivos, como son los que entran en la composicion de las membranas

mucosas y serosas: otros por fin que distribuidos en el parankima de los órganos absorven la materia desprendida por la acción vital. A esta última se la llama *absorción intersticial*.

Aunque destinados á absorber materiales distintos son con todo unos mismos en todas relaciones; su fin principal es conducir al sistema venoso los líquidos que contienen; y constituyen un mismo sistema llamado linfático porque se da el nombre de linfa al humor que contienen.

El sistema linfático se compone de vasos linfáticos, glandulas ó ganglios linfáticos, y canal torácico. Los vasos linfáticos nacen como queda dicho de los puntos de los órganos y de sus superficies, se anastomosan frecuentemente y forman tejidos reticulares muy sùtiles y tan numerosos que ha dado margen á algunos para creer que el cuerpo se hallaba en gran parte formado de absorbentes; su calibre y figura es irregular, son ya redondos, cilindricos, complanados etc. Su estructura es poco conocida, su color rijo pálido, poco consistentes y dotados de mucha sensibilidad y encogimiento orgánicos.

Las glandulas linfáticas son muy numerosas y se componen al parecer del entretejido de los mismos vasos linfáticos. No obstante la facultad de atraer de que se consideran dotados dichos vasos es verosímil la tengan preferente con ciertas sustancias. Las que son absorvidas, al llegar dentro del vaso escitan y promueven su contracción por la que aprieta lo contenido, y dirige hácia delante.

*Mecanismo
de la absor-
ción.*

Para explicar este mecanismo se debe suponer que la contracción de estos vasos es dirigida desde su origen como movimiento vermicular, y que al tiempo de encogerse se constriñe su embocadura para no dejar salir el líquido comprimido cerca su origen. En lo restante del vaso corre la linfa por la misma acción de

sus paredes oponiéndose al movimiento retrogrado, las valbulas que tiene y las nuevas columnas de líquido que se suceden. De este modo es conducida la linfa hasta las glandulas linfáticas en donde por la demora que sufre para atravesar las tortuosidades de las ramificaciones, sutilísimas que la constituyen: y por medio de la serosidad arterial que se le une adquiere nuevas modificaciones, esto es, se hace mas íntima su combinacion y resulta mas homogenea. Con estas cualidades pasa á otros vasos que la conducen á otras glandulas para identificarse mas; de estas á otros vasos y á otras glandulas hasta llegar por medio de algunos menos numerosos pero mas gruesos al sistema venoso, donde entra oblicuamente siguiendo el curso de la sangre.

Los vasos linfáticos del tronco y extremos abocan casi todos á las venas subclavias por medio del canal torácico, cuya naturaleza es la misma que la de los demas linfáticos. Los de la parte exterior de la cabeza y del cuello desaguan, los de la parte derecha á la vena subclavia derecha, y los de la izquierda á la subclavia del propio lado.

Llámase linfa un humor contenido en los vasos linfáticos. Las cualidades físicas de la linfa son: un color pálido rosaceo, olor espermático, y gusto salado. Sin embargo estas cualidades varían en razon á las sustancias absorbidas. Cuando se deja en reposo se coagula, y la masa se ve formada de dos partes: una sólida celulosa que contiene dentro sus celulas la otra que es líquida. Si se separa la parte sólida la líquida se coagula nuevamente.

Linfa.

El coágulo de la linfa tiene mucha analogía con el de la sangre; adquiere un rojo de escarlata con el contacto del oxígeno, y con el ácido carbónico un rojo purpúreo. En el analisis de la linfa, al paso que inexacta, se obtiene en diferentes proporciones albu-

mina, muriate de sosa, fabrina, carbonate de sosa, forfate de cel, manganesa, y carbonate de cal disueltos en mucha porción de agua.

Quilo y su curso.

El quilo sustancia estraída de los alimentos es absorbido por los vasos lacteos ó quilíferos del canal digestivo y principalmente por los de los intestinos delgados mas numerosos que en el estómago é intestinos gruesos.

El quilo estraído de las sustancias grasientas animales ó vegetales tiene un color de leche, es un poco mas pesado que el agua destilada, de olor espermático y de sabor salado y alcalino. En reposo se coagula formando una masa cuasi sólida y se separa en tres partes: una sólida que queda al fondo del vaso; otra líquida encima del coágulo, otra que forma una capa muy delgada á la superficie del líquido.

El quilo en este caso toma un tinte rosaceo mas vivo. Cuando no es de materias grasientas presenta iguales propiedades, pero su color es mas pálido y trasparente y la capa menos sensible; sin que este ni el antecedente presente jamas el color de sustancias colorantes mezcladas con los alimentos.

La capa que nada sobre el liquido es un cuerpo grasiento; el coágulo es formado de fibrina y de poca materia colorante roja; el liquido es análogo al suero de la sangre. La proporcion de estas tres partes varia segun la naturaleza de los alimentos. Por fin las mismas sales que ecsisten en la sangre se encuentran en el quilo aunque en proporcion diferente.

Los vasos linfáticos que se abren dentro los intestinos y estomago absorben el quilo por un mecanismo análogo al que lo hacen los demas absorbentes, el curso es tambien igual y favorecido por las mismas circunstancias ventajosas, es conducido á las glándulas linfáticas del mesenterio en donde experimenta modificaciones importantes de combinacion y

homogeneidad: desde estas es llevado por los vasos quilíferos secundarios al reservorio del quilo, de donde pasa al canal torácico, que lo aboca junto con la linfa á la vena subclavia izquierda cuando es un solo canal, y á las dos subclavias cuando es doble.

La absorcion del quilo continúa bastante tiempo despues de la muerte. Este fenómeno se atribuye á cierta contractilidad orgánica que tienen los absorbentes semejante á la de los vasos vegetales que continúan en su funcion independientes de los demás sistemas orgánicos. La progresion del quilo es tanto mas rápida cuanto es mas abundante.

Aparato venoso.

Este aparato se compone de las venas, parte derecha del corazon, y arteria pulmonar. Toma origen de todas las partes del cuerpo por capilares finisimos que son continuacion de los arteriosos. Se reúnen para formar troncos mayores, estos para otros mas grandes hasta que reuniéndose en uno comun, la vena cava, desagua á la aurícula derecha del corazon, siendo mayor la capacidad total de los ramos que la de los troncos, por cuya razon la sangre corre con mas velocidad cuanto mas se acerca al corazon. El curso de la sangre por las venas es por la propia accion de ellas y es favorecida por los empujes de la columna de sangre que viene detras, no menos que por las valvulas que impiden su retrogradacion.

Era preciso que las venas fuesen dotadas de valvulas que dividiesen las columnas de la sangre para dividir el peso de ella atendida la poca fuerza respectiva de sus paredes que no obstante de estar formadas de tres tunicas como las arterias son mucho menos enérgicas y resistentes que las de estas, y no tienen movimiento sensible de dilatacion y contrac-

cion á escepcion de los troncos inmediatos al corazon.

La capacidad venosa es mucho mayor que la arterial ya porque el número y calibre respectivo es mayor, ya tambien porque sus tunicas son mas estensibles; de esto depende que el círculo de la sangre venosa es mas lento, y mayor la cantidad de sangre venosa que la arterial. Las propiedades de las venas por cuya accion la sangre corre por ellas son la elasticidad y contractilidad orgánicas, siendo de notar que cuanto mas grandes son las venas son mas elásticas y menos irritables; al contrario cnanto mas pequeñas son mas irritables y menos elásticas.

Las causas que favorecen el curso de la sangre venosa son las compresiones continuas ò alternativas de los vestidos, y principalmente la presion habitual de la piel en las venas esternas; las presioaes de los músculos y entrañas en las internas. Estas presiones y demas causas accesorias son relativas á la disposicion de las venas, esto es, son mas multiplicadas en aquellas cuyas paredes son mas débiles y desprovistas de valvulas como dentro el abdomen y pecho; al contrario las valvulas son muy numerosas y las paredes de un espesor mas considerable cuando aquellas influyen menos como en las subcutaneas.

Las venas comunican entre si sobre todo las esternas con las internas para proporcionar el libre círculo por estas cuando aquellas son comprimidas por una causa exterior. La facultad absorbente que atribuye *Magendie* à las venas fundado en experimentos muy convincentes, pruevan mas bien la ecsistencia de vasos absorbentes en las tunicas de las venas los cuales abocan en lo interior de las mismas.

La sangre venosa por fin llega à la aurícula derecha cuando se dilata, y en su contraccion la mayor parte pasa al ventrículo que se dilata para recibirla, y otra menor vuelve á la vena. Luego

el ventrículo se contrae y pasa la sangre á la arteria pulmonar; no puede retroceder á la aurícula porque se lo impide la válvula tricúspide que cierra la avertura auriculo-ventricular. Las paredes de la parte derecha del corazon son mas débiles, mas delgadas y mas estensibles que las de la izquierda.

La sangre impelida por la arteria pulmonar no puede volver al ventrículo porque se oponen á ello las válvulas sicmoídeas. Atraviesa la arteria por el impulso casi único del ventrículo derecho del corazon por ser poca la accion de aquella á causa de la delgadez de sus tónicas poco irritables, elásticas y sin válvulas.

Circulacion.

Tenemos ya el quilo y la linfa en union con la sangre venosa dentro las subclabias y conducida por la arteria pulmonar á los pulmones, en donde sufre la preparacion mas importante que es la sanguificacion ó transformacion de la sangre venosa en arterial.

Para hacer mas comprensible el estudio de este fenómeno parece debemos empezar por las cualidades de la sangre venosa cuando entra en los pulmones comparandolas con las que tiene cuando sale de ellos: en seguida ecsaminar el reactivo agente de esta mutacion y el modo como es creible pueda efectuarse.

Se da el nombre de sangre venosa al líquido animal contenido dentro las venas parte derecha del corazon y arteria pulmonar, cuyo conjunto forma el aparato venoso.

La sangre venosa tiene un color rojo oscuro, oloroso específico, sabor particular, se le reconocen sales y principalmente el muriate de sosa; su peso específico mayor que el de la agua destilada, su

temperatura media es de treinta y un grados termómetro de Reaumur. Estraida la sangre venosa de sus vasos y dejada en reposo se coagula en una masa blanda que se separa espontaneamente en dos partes, una líquida amarillenta y trasparente llamada suero; otra mole casi sólida de un rojo muy oscuro y enteramente opaco que se llama *cruor* ó *coágulo*. Este ocupa el fondo del vaso y el suero está á su derredor. Algunas veces se forma en la superficie del suero una capa delgada, blanda, rojiza á la que llaman *costra de la sangre*. La separacion no tiene lugar si se la agita.

Puesta la sangre venosa en contacto con el gas oxígeno ó el aire atmosférico adquiere un color rojo encarnado; con el amoníaco toma un color rojo carmesí; con el azoe un rojo bruno mas oscuro. La variacion de color pende de haber absorbido una cantidad bastante considerable del gas en contacto con ella. En la análisis del suero se encuentra mucha porcion de agua, bastante albúmina y una pequeña porcion de lactate de sosa, materia animal y fosfate de sosa. El coágulo es esencialmente formado de fibrina y materia colorante. Separada esta la fibrina queda sólida, blanquisca, insipida é inodora, mas ponderosa que el agua, sin accion sobre los colores vegetales, elástica cuando es húmeda, y quebradiza cuando seca. En la destilacion dá mucho carbonate de cal y de sosa. La fibrina está compuesta de carbone, oxígeno, hidrógeno y azoe.

La materia colorante es soluble en el agua y en el suero de la sangre. Parece formada cuando se mira con una lente de pequeños globulos; quemada da un carbon cuya ceniza contiene oxide de hierro, fosfate de cal y de magnesia, cal pura y acido carbonico. El contacto del aire y el reposo favorecen la coagulacion de la sangre, pero la principal cau-

sa es la perdida de su vida. En muchas circunstancias morbosas la sangre se coagula dentro sus propios vasos. No obstante lo dicho la composicion de la sangre varia en razon de las materias absorvidas pudiendo contener sustancias que no tiene habitualmente transportadas á ella por la absorcion.

La sangre con estas cualidades es conducida á los pulmones, de donde despues de haber sufrido la preparacion pulmonar sale por las venas pulmonares con las cualidades siguientes: color rojo de escarlata, olor mas fuerte y sabor mas pronunciado; su temperatura un grado mas elevado; contiene menos suero, tiene mas tendencia á la coagulacion, ó que es lo mismo es mas fuerte su plasticidad; su peso especifico menor, y menor la capacidad para el calórico.

El reactivo de la transformacion de la sangre venosa en arterial es el aire atmosferico que entra en los pulmones por medio de la respiracion.

Respiracion.

Se entiende por respiracion la entrada y salida alternarissas del aire en los pulmones de que se infiere que la respiracion consta de dos movimientos, uno en que entra el aire por la glotis y se distribuye ó penetra hasta las últimas ramificaciones bronquiales, llamado *inspiracion*; otro en que el aire sale llamado *expiracion*. El primero debe por tanto preceder al segundo ó de expiracion.

Estos movimientos se efectuan mediante dilatarse los pulmones en la inspiracion, y contraerse ó fruncirse en la expiracion. Paraque esto suceda es preciso que se dilaten y contraigan simultaneamente con ellos las paredes del pecho compuestas por las costillas, esternon, columna vertebral y diafrag-

ma los cuales se mueven al efecto, y el diafragma por una accion propia se deprime hácia el vientre en la inspiracion y sube hácia el pecho en la espiracion. Las demás paredes del pecho escepto la coluna vertebral se ensanchan por la accion de los músculos respiratorios, que se atan á ellas, en la inspiracion, y en la espiracion se abajan ó restituyen pasivamente á su primer estado. De todas estas partes ninguna hay tan importante como el diafragma, pues por él solo se dilata el pecho en el estado sano. De las demás paredes la parte inferior y anterior del pecho se mueven mas para los movimientos de la respiracion que las laterales y parte superior.

Sentados estos principios pasemos á averiguar la entrada y salida del aire en los pulmones y los cambios que el mismo experimenta. En la inspiracion los pulmones y paredes del pecho dilatandose ensanchan su cavidad, y por este mecanismo entran en los pulmones de treinta á cuarenta pulgadas cúbicas de aire atmosférico compuesto de setenta y tres partes de azoe, veinte y siete de oxígeno y una ó dos centesimas de gas ácido carbónico; su temperatura es la de la atmósfera, es elástica y compresible en razon á su temperatura. Cuando sale se ha reducido á treinta y tantas pulgadas compuestas de veinte y tres partes de azoe diez y seis de oxígeno y lo restante de ácido carbónico. Mas va tambien mezclado un vapor aguoso que se cree es la transpiracion pulmonar.

De lo dicho resulta que la mutacion que el aire ha experimentado en los pulmones es el haber perdido diez ó doce centesimas partes de oxígeno, y haberlas réemplazado con otras tantas de gas ácido carbónico: por consecuencia los cambios que ha experimentado la sangre al traves de los

pulmones son debidos al oxígeno siendo creible que suceda del modo siguiente.

Sanguificacion.

La sangre venosa conducida á los pulmones por unos vasos muy dilatables, poco sensibles y destituidos de circunstancias que favorezcan su curso, como son las arterias pulmonares que no obstante de contener sangre poco escitante son destituidas de valvulas, le proporcionan un curso lento y por lo mismo poder demorar algunos instantes en las últimas ramificaciones que rodean las vesiculas bronquiales donde se ampara del oxígeno que ambiciona muchísimo; ni es necesario para esto del contacto inmediato porque lo alcanza metida en cualquier vega ó receptáculo membranoso que se sumerja en dicho gas.

La sangre cede su carbono al oxígeno para formar el ácido carbónico, y como no puede entrar el oxígeno en esta nueva combinacion sin que se desprenda una porcion del calórico que le mantiene en estado de gas, la sangre se apodera de este calórico libre y resulta mas caliente. Abandonado el carbono muda la sangre su color negro en un rojo bermejo y brillante. Parte del oxígeno se une al hidrógeno de la sangre formando agua que sale en forma de vapor en la espiracion y por la pérdida de este principio aumenta de consistencia. Parte del oxígeno se queda en la sangre y la pone espumosa y mas ligera; su concrecibilidad y fuerza plástica se aumentan y así da menos suero cuando se coagula.

Por tanto la sangre venosa se ha hecho arterial con ceder al oxígeno de la atmósfera su carbono é hidrogeno escedente y cargandose de oxi-

geno y de calorico. La sangre despues se despoja de estos dos principios á medida que alejandose del corazon se combina y forma ocsides de hierro y de carbono como verémos á su tiempo.

Aparato de la Sangre arterial.

Se compone de las venas pulmonares, de las cavidades izquierdas del corazon y de las arterias. El curso arterial empieza pues en los extremos capilares de las venas pulmonares y acabà en los extremos capilares de las arterias. La sangre siendo ya arterial es mas estimulante y por ello escitados con viveza los extremos capilares, se contraen y la impelen hácia los troncos mayores de la vena pulmonar; estos con su preseneia se escitan y contraen y la hacen pasar á la auricula izquierda del corazon, siendo este curso favorecido por el empuje de las sucesivas columnas de liquido que vienen detrás.

Cuando la auricula izquierda se dilata las venas pulmonares le avocan la sangre de que se llena; luego se contrae y una parte pasa al ventrículo y otra refluye à las venas pulmonares. Para entrar la sangre en el ventrículo es preciso que este se dilate y asi resulta que cuando la aurícula se dilata el ventriculo se contrae; cuando esto se contrae se dilata la arteria aorta y pasa la sangre à ella sin que pueda volver á la auricula porque la valvula mitral se eleva y tapa la avertura auriculo-ventricular. Las contracciones de la parte izquierda del corazon son mas fuertes que las del derecho, ya porque su espesor y consistencia es mayor, mayor la escitabilidad, y mas estimulante la sangre que pasa por ella.

Cuando la sangre ha pasado á la aorta esta se

(III)

contrae para hacerla correr á lo largo de todas las arterias del cuerpo sin poder volver atras porque se lo impiden las valvulas sicmoideas que en este movimiento tapan la avertura ventriculo-arterial. El paso de la sangre al traves de las arterias hasta sus últimos capilares es debido á la propia accion de la túnica media ó lacertosa que las constituye, favorecido tambien por las nuevas columnas sucesivas , y segun algunos por la fuerza de empuje del corazon.

El movimiento por el que las arterias hacen correr la sangre es un movimiento sensible conocido con el nombre de pulso el cual es dividido en dos tiempos dilatacion y contraccion. Este movimiento de las arterias es análogo al del corazon; en estado sano parece igual en todas relaciones, pero en ciertas enfermedades distan mucho de ser isocronas ú iguales las sensaciones. La posicion y estructura de las partes es tal que no son comprimidas las arterias que atraviesan músculos ni en los movimientos mas fuertes porque todas las arterias de un cierto calibre que penetran músculos estan rodeadas de un anillo tendinoso que estirado por las fibras que se atan á su contorno, se ensanchan cuando el músculo se contrae.

La fuerza de las arterias es relativa al grosor de sus paredes, por cuyo motivo siendo como son las paredes mas gruesas en razon al volumen de los vasos, cuanto menor es este las arterias son respectivamente mas fuertes; por esta razon son menos frecuentes los aneurismas en arterias pequeñas.

De las tres túnicas que entran en la composicion de la arteria la celulosa ó esterna y la interna ó epidermimoidea son susceptibles de bastante estension y esta última dispuesta por su superficie lisa, escurrediza y barnizada de una serosidad

que trásuda por ecsalacion, mas sirve para facilitar el curso á la sangre que para aumentar la fuerza de las arterias. Esta fuerza es debida principalmente á la túnica media ó amarilla la cual es seca, poco estensible, facil de romperse, y muy elástica. A la elasticidad deben principalmente las arterias su contraccion. La reaccion pues de las arterias contra la sangre depende de la elasticidad y fuerza contractil orgánica, con la diferencia que la elasticidad influye principalmente en la constriccion de los troncos mas gruesos, mientras que la irritabilidad produce casi sola el encogimiento de las arterias mas pequeñas.

Como las arterias llevan el material de incremento á nuestros órganos conviene que sean proporcionalmente mas gruesas las de aquellos cuya nutricion es mas activa, y el calibre ha de ser siempre relativo al desarrollo natural ó morbífico de los órganos.

El movimiento del corazon y arterias es mas vivo y por lo mismo es la circulacion mas rapida cuanto mayor es la elasticidad y mayor el incremento del cuerpo, por esta razon en los niños, en las mugeres, y nerviosos son mas frecuentes las pulsaciones.

Las arterias jamas quedan vacias de sangre naturalmente en todo el tiempo de la vida. Cuando la sangre desde un tronco principal pasa á las ramas que nacen de él es dividida la columna principal en tantas pequeñas cuantas son las ramas, y esta separacion se hace por una especie de espolones de que estan guarnecidos los orificios de cada arteria.

Causas que retardan el curso de la

Quando un liquido pasa de un espacio mas estrecho á otro mas ancho disminuye su velocidad; por esta razon la rapidez con que corre la san-

gre, debe disminuir á medida que se aleja del co- *sangre arte-*
 raron, pues que tomadas en junto las ramas que *rial.*
 dá un tronco presentan un calibre mayor que el
 del mismo tronco resultando por consecuencia que
 la capacidad del sistema arterial crece á medida
 que se aleja del corazon.

Otra de las causas que retardan el curso de la
 sangre arterial es la direccion tortuosa de las ar-
 terias que se distribuyen por las paredes de las
 vicerias huecas; bien que este retardo es parcial.

Tambien se disminuye el curso de la sangre en
 aquellas arterias que se anastomosan inclinándose en
 forma de arco una hácia otra boca á boca, por-
 que entonces topandose las dos columnas se repelen
 mutuamente y pierden gran parte de su movi-
 miento.

En la anastómosis de segunda especie, que es *Causaue*
 cuando dos ramos se unen para formar un tronco *favoreee la*
 mayor que cada una de ellas en particular pero *progresion.*
 menor que las dos juntas como sucede con las ver-
 tebrales para formar la basilar se aumenta la fuer-
 za de progresion porque la sangre pasa de un lu-
 gar mas ancho á otro mas estrecho.

Los sacudimientos que reciben las arterias por *Otra.*
 la accion orgánica de las partes que atraviesan fa-
 vorecen el curso de la sangre arterial.

Las arterias terminan en el tejido de nuestros *Terminacion*
 órganos convertidas en un sin número de ramifica- *de las arte-*
 ciones sutilisimas llamadas capilares, en cuyo es- *rias.*
 tremo empieza el sistema venoso por otros tantos
 pequeños vasos que son continuacion de los prime-
 ros, sin que entre las estremidades venosas y arte-
 riales haya parenquima ni tejido esponjoso à excep-
 cion tal vez en las del pene, clítoris, plecso rec-
 tiforme que rodea la entrada de la vagina, y en
 el bazo.

El tejido de los órganos se halla lleno de redes maravillosas formadas por los capilares arteriales y venosos en union con los vasos linfáticos. La sangre que corre por los capilares parece absolutamente libre del influjo del corazon, su círculo es mas lento y dotado de movimientos oscilatorios; los globulos rojos se hallan como aogados en el suero sin poder reflejar su color. Los vasos capilares son susceptibles de aumentar su calibre considerablemente cuando alguna causa cualesquiera provóca un centro de flucsion.

El número y calibre de capilares en cada órgano es relativo à la cantidad de materiales que debe estraer de la sangre; por esto en los órganos secretorios es mayor que en aquellos donde la vida se limita á la elavoracion nutritiva como en los huesos, tendones, ligamentos etc.

Mientras la sangre pasa por los troncos no cumple con objeto alguno de los destinados á la circulacion, pues que la sanguificacion, secreciones y nutricion que son sus fines directos tan solo pueden efectuarse en los capilares. Hemos visto ya que la sanguificacion se efectuaba en los capilares pulmonares resta ahora esponer las secreciones y nutricion que se verifican en el sistema capilar general.

Secreciones.

Se dá el nombre de secrecion á aquella funcion por la que se separa de la sangre algun humor particular mediante la accion de algun órgano. Se dividen en tres especies: *exhalaciones*, *secreciones foliculares*, y *secreciones glandulares*. Las diferencias de los humores segregados son anejas á las que ofrecen los aparatos orgánicos empleados para su formacion.

Las exalaciones se dividen en interiores y este- *Exalaciones.*
riores. En todas las partes de lo interior y exterior
del cuerpo se hacen exalaciones: en las membranas
serosas, sinoviales, mucosas, tejido celular, en lo in-
terior de los vasos, piel etc.

Los humores formados por esta especie de secre-
ciones no son mas que el suero de la sangre debil-
mente alterado por la accion poco enérgica del apa-
rato orgánico destinado á este objeto, sea que de en-
tre los extremos capilares arteriosos y venosos nazca
un sencillo conducto escretorio que permita trasudar
el suero de la sangre ó que este pase por las criptas
ó poros de sus paredes. La falsa denominacion que
damos á esta secrecion la empleamos solo para sig-
nificar que no hay elavoratorio intermedio entre el
vaso aferente y el conducto escretorio, sino que se-
parado el líquido de los capilares sin mas prepara-
cion humedece las membranas que ellos mismos com-
ponen.

Sigue á la trasudacion serosa la secrecion que *Secrecion fo-*
efectuan los folículos glandulosos y lagunas mucosas. *licular.*
Los humores que trabajan esas glandulitas puestas en
lo interior de las membranas mucosas son menos flui-
dos y mas viscosos que la serosidad de las exalacio-
nes; contienen mas albumina y mas sales, se dife-
rencian mas del suero de la sangre y son de una na-
turaleza mas escrementicia. Son por tanto mas com-
plicados y por esto los órganos secretorios deben
serlo también: en efecto en estos ya no es mera exa-
lacion y el humor exalado se elabora en el pequeño
receptáculo ó folículo antes de salir á la superficie
de las membranas; no obstante es una exalacion, pero
que dista de la precedente en que no se limita en
filtrarse el suero al treves de las paredes de los va-
sos sino que debe sufrir una elavoracion por la accion
del folículo sin la cual no desempeñaria bien los fines

á que está destinado ; despues es abocado en la cavidad que tapiza la membrana mucosa por un conducto escretorio siempre corto, de que carecen las exalaciones. Algunas veces estos conductos escretorios se reunen, se confunden y se abren juntos como sucede en las amígdalas , en las lagunas mucosas del recto y uretra , base de la lengua etc.

Cuando las superficies que guarnecen las membranas muccas necesitan humedecerse se contrae la bolsita y vomita el licor que la llena , siendo favorecida la secrecion y escrecion por la irritacion que ocasiona la presencia de las sustancias que contienen las cavidades , como el aire en la traquea y bronquios, los alimentos en el tubo digestivo, y la orina en las vias orinarias. Tambien es favorecida por las contracciones periástalticas de los planes musculares á que están aderidas las membranas mucosas.

Secrecion glandular.

La naturaleza de los humores que se separan en las secreciones glandulares en nada se parece á la de la sangre y los hay cuyos principios constitutivos no se encuentran en la sangre á lo menos en cantidad proporcionada ; por esto tambien conviene que los órganos que deben elavorarles gozen de una estructura muy complicada. A estos órganos llaman glandulas conglomeradas. Las forman un conjunto de nervios y vasos de toda especie dispuestos en forma de globulitos y reunidos por un tejido celular , y cada uno de ellos embuelto en una pequeña capsula que es continuacion de la membrana que reviste su parte exterior.

La disposicion intima de las diversas partes que entran en la composicion de las glandulas secretorias es diferente en cada una de ellas y forma su *parenquima* respectivo. Esta misma disposicion particular esplica las diferencias que deben presentar relativamente los humores segregados , pero sin que nos con-

duzca à una idea justa del modo de obrar para el resultado: sin embargo nos es lícito esponer en este lugar la idea que de ello tenemos formada.

De estos extremos capilares que rodean los lobulitos glandulares nace un vaso aferente que podemos llamar secretorio dotado de la propiedad absorbente electiva por la que separa de la sangre los principios que conviene á aquella secrecion negándose en el estado sano á absorber otras sustancias, á la manera que los vasos absorbentes de los intestinos se denegan á absorber los escrementos aunque sean líquidos y se erizan esclusivamente por el quilo y del mismo modo que cada una de las partes de nuestro cuerpo elige y asimila á su propia sustancia los materiales inconveniables por el arte. El vaso ó conducto escretorio aboca las sustancias elegidas en el poro ó lobulito glandular el que à la par de los folículos mucosos las elavora nuevamente, las convina y naturaliza favorecido de los linfáticos que absorben lo escedente. Cuando el lobulito está lleno, ó por irradiacion es escitado se contrae y deja escapar en el conducto escretorio respectivo el material que contiene. El conducto escretorio despues de un corto trayecto se une con otros precedentes de otros lobulitos formando un tronco comun que se une con otros hasta que en un punto determinado de la glandula forman el tronco principal ó conducto escretorio de la glandula. Durante este tiempo de mansion al traves de los conductos escretorios particulares va elavorándose mas y mas, y depositado por fin en un resceptáculo que tienen algunos acaba de adquirir las propiedades características específicas del humer segregado.

Secreciones en particular.

Las secreciones se dividen en naturales y accidentales; las primeras son las que se efectuan en órganos

conocidos llamados *glandulas conglomeradas*, y las segundas son las que se forman por cambios particulares de algun órgano transformándose en *elevatorio de secrecion*. Dejaremos la secrecion de la leche y la menstruacion que en rigor no corresponden ni á una ni á otra de las dos especies para cuando se trate de ellas en las funciones sexuales, asi como dejaremos para el mismo lugar la secrecion del semen.

Cada una de las secreciones particulares está comprendida en la teoria de las secreciones en general, y por esto aqui solo espondremos algunas circunstancias acerca la de la bilis y orina que merecen particular atencion. Tambien trataremos separadamente de la transpiracion cutanea por ser de mucha utilidad su conocimiento en la Medicina.

Secrecion de la bilis.

Distingue esta secrecion de las demas el abocarse en su órgano secretorio, el *higado*, una muy grande cantidad de sangre venosa por medio de la vena *porta* que se distribuye en esta entraña al modo que las arterias en los demas órganos.

La bilis es un humor segregado en el higado de color amarillo verdoso, amargo, viscoso y untuoso, cuyos caracteres son mas sensibles cuando ha sido detenida en la vegiga de la hiel. Contiene agua, albúmina, una materia resinosa, un principio colorante amarillo, sosa, muriate, sulfate y fosfate de sosa, fosfate de cal, y ocside de hierro. Aqui se habla tan solamente de la bilis cistica pues la epática que es la que se encuentra en el conducto epático ó antes de abocarse en la vegiga de la hiel no puede ser analizada por la poca cantidad que puede recojerse; no obstante se nota que es menos oscura, menos viscosa y menos amarga que la cistica.

La bilis es abocada en el duodeno por medio del conducto colidoco para la digestion duodenal y sirve, como hemos espuesto, para separar unida con el quimo, la parte nutritiva de la escrementicia.

La dificultad está en decir si la bilis es formada por sangre venosa conducida al hígado por la vena porta, ó por la sangre arterial que le conducen no solo las arterias epaticas sino tambien diferentes ramos que le prestan otras arterias. Nosotros sin tomar parte en esta discusion en que ambas opiniones son igualmente oscuras, diremos que siendo los poros biliares formados á la vez de los extremos capilares de las venas porta y hepática confundidos con los arteriosos, no será fuera de propósito creer que ámbas concurren para la secrecion de dicho humor, sobre todo cuando las inyecciones demuestran con evidencia que todos los vasos del higado arteriosos, venosos, hisfáticos y escretorios comunican entre si.

Secrecion de la orina.

Hay tres especies de orina; orina de bebida: orina de quilo, y orina de la sangre.

La prontitud estremada con que un liquido pasa à la vegiga urinaria ha hecho creer la ecsistencia de una via directa de comunicacion entre estas dos entrañas. Sea como fuere es cierto que se ven hombres que mean un liquido al mismo tiempo que lo beben con sus cualidades mismas: á esta orina llaman de bebida.

La orina de quilo supone que ha demorado la Orina de bebida en el estómago, ha perdido de sus cualidades, adquirido otras, y se ha constituido orina con caracteres de tal.

La orina de la sangre al paso que sujeta á gran-

des variaciones en razon á la edad, al temperamento, al clima, estacion, y sobre todo al uso de diferentes substancias se le observa á mas ó menos las condiciones siguientes en el estado de salud: color amarillo anaranjado, sabor salado y un poco ccre, olor específico. Se compone de agua, moco, materia animal, ácido urico, ácido fosfórico, ácido lactico, muriate de sosa y de amoniaco, fosfate de sosa de amoniaco de cal y de magnesia, sulfate de potasa, lactate de amoniaco y de silice. Las substancias de que se hace uso vuelven diferente la proporcion de estos principios, y aun le hacen concurrir alguno de nuevo.

La secrecion de la orina es muy abundante y de naturaleza escrementicia, es por esto que su supresion es origen de funestos resultados. Somos advertidos de la necesidad de su espulsion por un sentimiento instintivo que pasa á ser doloroso sino se satisface á tiempo. Como los demas instinctos está sujeto al imperio del hábito y á infinitas modificaciones ó fenómenos nerviosos.

La orina se detiene poco para atrevesar los poros urinarios por la mucha energia de que gozan sus órganos secretorios, *los riñones*. Las artérias renales que llevan la materia de la secrecion, son mas gruesas à proporcion que las de los demas órganos secretorios, sus capilares al paso que muy numerosos conservan el calibre bastante grande.

Se segrega en los paquetes glandulares de la substancia cortical, pasa por otros tantos conductos excretorios, cuyo conjunto forma la *tuvulosa*, recibiendo al treves de ellos mayor grado de combinacion, chorrea sin cesar por las papilas renales en el caliz ó pelvis del riñon: de aqui pasa por los ureteres á la *vegiga urinaria* que se dilata mecanicamente en razon à la cantidad de humor que contiene, y en el se retiene

hasta que contraiéndose, y venciendo la resistencia del esfínter la espela afuera por la uretra.

El paso de la orina por los ureteres es debido á la propia accion de estos, favorecido sin embargo del empuje de nuevas columnas de orina, de la presion de las entrañas, de los movimientos del diafragma y músculos del abdomen, y de los choques de las artérias circumvecinas.

La orina entra continuamente en la vegiga sin que se lo impida la llenura de esta, ni pueda volver atras en los ureteres por la direccion oblicua con que la atraviesan.

La escrecion de la orina se efectua cuando por su cantidad ó cualidad, ó cuando por influencia nerviosa se halla la vegiga escitada, en cuyo caso se contrae llamando á su favor la depresion del diafragma y la accion de los msúculos del abdomen, lo mismo que hemos dicho para la escrecion de los escrementos, con sola la diferencia que para la de estos se necesita el obrar continuo de las fuerzas auxiliares, mientras que para la escrecion de la orina solo deben obrar las potencias accesorias hasta vencer la primera resistencia pues que ya vencida basta la sola contraccion de la vegiga para concluiría.

El paso de la orina por la uretra no es meramente pasivo; pues este conducto estimulado por la presencia del humor se eriza y encoge para obrar contra el, siendo la escrecion mas rápida cuanto es mayor la accion de la uretra, por esto los viejos que la tienen poca no pueden espelerla lejos. *Esposicion.*

La escrecion de la orina se suple mutuamente con la transpiracion cutanea, y sus humores tienen entre si mucha analogía, por esto en el invierno y paises frios se orina mas porque se suda menos, y al contrario en los paises calientes y en verano se orina menos y transpira mas.

De la transpiracion cutanea.

De toda la superficie de nuestro cuerpo exala continuamente un vapor que se llama transpiracion cutanea. Se le da el nombre de *insensible* cuando convertida en gas por medio del aire que la disuelve se oculta á nuestra vista; y recibe el de *sudor* cuando es mas abundante y fluye bajo la forma líquida.

La transpiracion cutanea es una exalacion arterial que sale por tubulillos ó de las porosidades de las paredes de las arterias de los capilares que se distribuyen en los tegumentos; se resume en los intersticios de las escamas epidérmicas, y la capa de aire que nos envuelve carga con ella y la lleva consigo, al paso que se va renovando. Entre la transpiracion cutanea y la pulmonar hay tanta analogía que puede decirse una misma, y se reemplazan mutuamente. Tambien se reemplaza con la exalacion de todas las membranas mucosas como de la nariz y canal digestivo etc. pero con ninguna de las que tenemos dicho hay quizá un vínculo tan estrecho como con los órganos secretorios de la orina.

Concursos
de causas
para la
transpira-
cion.

Se puede decir que la transpiracion está en razon compuesta de la fuerza con que el corazon arroja la sangre á las artérias capilares; de la energía vital del órgano cutaneo; y de la facultad mas ó menos disolvente de la atmósfera. Los hombres mas fuertes transpiran mas; ciertas partes de la piel transpiran mas que otras; cuando el aire está seco caliente y renovado con frecuencia se pierde mas por la piel y hay mayor necesidad de repararse con alimentos y bebidas.

La transpi-

Si la transpiracion es mucha el cuerpo se debilita de modo que siendo muy abundante y continuada el hombre se pierde por consuncion.

Muchos fisiólogos conjeturan que el aire que nos circunda no solo sirve para disolver la materia de la transpiracion, si que tambien para que el oxígeno de la admósfera pueda convinarse con el carbono de la sangre traído al tegumento por los vasos sanguineos, como tambien con la gelatina que forma la sustancia del tejido reticular de Malpigio; semejante opinion da origen á la de considerar la piel como un órgano suplementario de la respiracion. *Efectos de la transpiracion.*

La transpiracion proporciona ademas un excelente refresco en virtud del cual conserva la naturaleza al cuerpo vivo en un grado de calor uniforme, mediante que el agua que se ecsala de toda la superficie del cuerpo le roba una gran cantidad de calórico.

Tambien sirve la transpiracion para mantener húmeda la membrana donde reside el sentido del tacto, y las estremidades de los nervios que se distribuyen en ella.

De las secreciones accidentales.

Entiendese por secrecion accidental aquella que se fragua espontaneamente y contra el órden regular: ella supone siempre un trastorno en el órgano donde se verifica. Se comprenden entre las secreciones accidentales; las alteraciones de los órganos secretorios por las cuales pervierten las cualidades del humor segregado; las aberraciones de secrecion, esto es cuando una secrecion natural se verifica en órgano distinto del que está destinado á este objeto, como cuando la menstruacion en lugar de verificarse por la vagina lo hace por narices, orejas, ojos etc.; y las transformaciones que sufren cuando son convertidos en elaboratorios de un humor impropio á ellos, como en las supura-

ciones. En uno y otro caso para que se verifique la secrecion accidental es necesaria la perversion de las propiedades del órgano, de aqui es que siendo estas susceptibles de variar al infinito tambien lo son los humores que dimanar de ellas.

De la nutricion.

La nutricion es el complemento de todas las funciones asimilativas: estas se dirigen á aumentar y preparar la sangre volviendola apta para nutrir, aquella consiste en apropiarse los órganos la materia nutritiva asimilandola á su propia naturaleza. La nutricion como se ha dicho en otro lugar reside en cada molecula orgánica mediante las fuerzas de eleccion y asimilacion particulares á cada una.

La maquina animal se destruye incesantemente por la perdida continua, de modo que considerada en dos épocas distintas de su duracion no contienesiquiera una misma molecula sin escluir las partes mas duras; pero es en estas mucho mas lento el desprendimiento que en las partes blandas y en estas mas que en los fluidos. La destruccion del cuerpo es relativa á la energia vital: los robustos, los niños, y las mugeres cuya accion orgánica es muy viva se consumen mas prontamente. Pero nuestras partes al paso que se destruyen se reparan de continuo por medio de particulas ecsactamente semejantes que eligen de la sangre; sin la cual condicion de homogeneidad se mudaria á cada instante la naturaleza que es siempre la misma á corta diferencia.

Cuando la materia nutritiva mediante las alteraciones sucesivas que ha experimentado está bien animalizada entonces las partes que riega la

retienen y la identifican á su propia substancia. Es la nutricion una verdadera secrecion por la que cada parte separa, retiene, y asimila lo que halla analogo à su naturaleza en los humores conducidos, y deja pasar las moleculas heterogeneas. Los huesos v. g. separan y se apropian el fosfate calcareo; el cerebro la albumina; los músculos la materia fibrosa; en fin cada parte se empapa y consolida en su tejido los jugos que son de su propia naturaleza en virtud de una afinidad vital que no puede ser imitada por el arte.

Las arterias son los únicos conductores de la materia nutritiva; los nervios son solamente accesorios de esta funcion. Es imposible explicar el mecanismo de la nutricion por leyes quimicas, porque los cuerpos vivos son laboratorios donde se verifican combinaciones y descomposiciones inimitables por el arte. La analisis de ciertas substancias animales dá principios cuya cantidad y calidad se ignora sbso-
lutamente no menos el como y de donde pueden haberseles ingerido, como si la fuerza vital pudiese formar completamente ciertos cuerpos que para nosotros son simples. Ninguna substancia puede servirnos de nutrimento que no sea susceptible de alterabilidad espontanea en virtud de la cual muden sus elementos de combinaciones y relaciones. Sea cual fuere la naturaleza de los alimentos, la de la materia nutritiva que se estrae de ellos es á muy corta diferencia la misma; y su animalizacion se verifica principalmente por la perdida de su carbono que reemplaza el azoe escedente de los liquidos animales. Si esta teoria no es convincente por faltarle el suficiente número de pruebas, debe ser un acsioma entre nosotros que los elementos constitutivos de nuestros órganos ya vengan de afuera ó ya se formen por la accion misma de la vida, salen de

nuestro cuerpo , y dejan de formar parte de el despues de haber permanecido cierto tiempo , y que son reemplazados por otros de la misma naturaleza ; resultando que el hombre ocupado incesantemente en transformar á su propia substancia otras heterogeneas , es reducido por esta parte á una ecsistencia puramente vegetativa.

Del calor animal.

En este capitulo solo se trata del calor termometrico , y no de las sensaciones aparentes de calor y frio , por ser estos fenómenos nerviosos que corresponden à la patologia general.

Los cuerpos vivos tienen con los inertes á mas de las diferencias anotadas en su lugar otra no menos constante cual es la de conservar una misma temperatura en toda estacion y clima. A esta propiedad de los cuerpos vivos se da el nombre de *caloridad* acerca la cual conviene ecsaminar tres cosas: 1.^a cual es el manantial del calor animal propio é independiente: 2.^a como se resisten los cuerpos vivos á la introduccion de una cantidad de calorico escedente cuando es rodeado de cuerpos que lo tienen en mas: 3.^a como lo conservan cuando envueltos de cuerpos que lo tienen en menos.

1.^a *Cuestion.*

Origen del

calor animal.

Dos son las principales fuentes de que trae origen el calor animal , una en los pulmones , y otra en las secreciones y nutricion: en ambas es el producto de las combinaciones que se experimentan en las transformaciones sucesivas. Para probar el origen del calor en estos dos manantiales , conviene tener presente que el calorico latente ó combinado en los cuerpos se desprende de ellos siempre que pasan del estado de gas al de líquidos , ó de este al de sólidos. Partiendo de este principio es facil probar que los cuer-

pos animales son un laboratorio continuado de todas las referidas transformaciones.

Origen del calor animal en los pulmones.

En primer lugar: en los pulmones se hace la sanguificacion cediendo la sangre venosa al oxígeno de la atmósfera el exceso de carbono y de hidrógeno para formar el vapor pulmonar y el ácido carbónico, y como no puede entrar el oxígeno en estas combinaciones sin que pase del estado de gas al de vapor, resulta que se desprende una porción de calórico del que se apodera la sangre con mas facilidad, porque á medida que pierde el hidrógeno y el carbónico se aumenta su capacidad para el calórico.

No puede nutrirse el cuerpo sin que el humor nutritivo que riega á los órganos se solidifique para formar parte de ellos: luego en esta transformacion ganeral una cantidad de calórico combinado que tenia la sustancia líquida ha debido quedar libre y á propósito para calentar las partes donde se efectua su desprendimiento. Por otra parte todas las partes de nuestro cuerpo sin exclusion se nutren continuamente: luego todas ellas deben experimentar sin intermision los efectos del calórico libre. La sangre que riega todas las partes, recibe continuamunte nuevas sustancias, ya sea por la absorcion interior, ya por respiracion, ó ya que por la absorcion cutanea se introduzcan en ella diversos elementos. Todas estas sustancias dejan libre cierta cantidad de calórico combinado que tienen, cuando experimentan nuevas transformaciones por la accion orgánica.

Origen del calor animal en todo el cuerpo.

De lo dicho hasta aqui resulta que el calor de los cuerpos vivos es mas grande á proporcion que tienen en si los medios de impregnar sus humores de mayor cantidad de oxígeno atmosférico, y que es tanto mayor cuánto la circulacion es mas rápida, y la vida mas activa: por esta razon los pájaros cuya capacidad del receptáculo pulmonar es mucho mayor

proporcionalmente que en los demas animales de sangre caliente, su respiracion mas frecuente, mayor la velocidad del pulso, y mas multiplicados y prontos sus movimientos por la actividad vital de que gozan, es tambien su temperatura ocho ó diez grados mas elevada que la del cuerpo humano. Los niños cuya energía vital es manifiesta por la velocidad de su desarrollo orgánico, tienen la temperatura mas elevada que los adultos.

*Segunda
cuestion.*

Acerca de cual sea la causa porque el cuerpo resiste á la introduccion de un calor superior al que es propio á su ordinaria temperatura decimos, que la transpiracion cutanea y pulmonar son el principal medio de refrigeracion; y como esta evaporacion se aumenta con el calor, este mismo proporciona el medio que debe servir para equilibrarle cuando es excedente en la atmósfera que nos circunda. Ello es que la evaporacion de los fluidos ó su disolucion en el aire es el medio mas poderoso para efectuar el resfriamiento de los cuerpos. Consta por experimentos que un animal vive impune en una atmósfera cuya temperatura sea muy elevada si puede transpirar, al paso que perece en otra mucho mas baja sino tiene proporcion de evaporar humores por la piel. Sin embargo parece que este medio no puede ser el único que emplea la naturaleza para mantener la temperatura animal en grado uniforme; conviene pues admitir en los cuerpos vivos una propiedad que no podemos explicar en virtud de la cual rechaza el calorico superabundante y perseveran en la misma temperatura.

*Tercera
cuestion.*

Como el cuerpo vivo se resiste al frio, y conserva su calor en medio de una atmósfera elada? Para satisfacer á esta pregunta conviene tener presente los efectos sensibles del frio sobre la economia animal. El hombre espuesto á una atmósfera fria experimen-

ta mayor agilidad y fuerza en todas sus funciones y con tal que el frio no sea riguroso, y que el cuerpo goze de un vigor regular, se desprende en el mismo una cantidad mayor de calórico suficiente para reparar la pérdida del que le roba el aire frio; como si la impresion de este sobre la piel obligase á la naturaleza á una reaccion general, ó á un aumento de actividad por parte de los órganos que acrecenta la suma de las combinaciones, que como hemos dicho, producen el desprendimiento del calórico en el cuerpo vivo: en una palabra el frio siendo un debilitante directo se transforma en este caso en ecsitante indirectamente provocando el esfuerzo del principio vital, pero este esfuerzo es mas notable cuando está espuesta al frio una parte solamente, que si lo fuera toda la superficie del cuerpo; porque obrando todo él sobre un punto limitado produce un efecto mas considerable. Con todo llega un término en que la naturaleza no puede oponerse al frio, y queda vencida; sucede esto cuando el frio es muy riguroso, y al individuo faltan fuerzas necesarias para rehacerse como conviene, entonces es inevitable su pérdida total si todo el cuerpo está sometido al influjo del frio, ó sucede la muerte parcial si está espuesta una parte solamente.

La muerte de nuestros órganos por el frio empieza siempre por las partes mas distantes del corazon como los dedos de pies y manos, y orejas; porque gozan de menor energia vital y la circulacion es mas lenta.

De lo dicho se infieren las siguientes resoluciones. 1.^a que el frio provoca el aumento de calor excitando indirectamente. 2.^a que para resistir al frio se necesita cierto grado de vigor y fuerza. 3.^a que la muerte es inevitable por el frio si la na-

turalaleza no puede rehacerse como conviene. 4.^a que el esfuerzo es mas notable cuanto es mas limitada la superficie espuesta al frio.

Funciones secсуales.

Se dividen en comunes y propias. Las primeras son el coito porque para verificarse ecsige el concurso de ambos secсуos. Las propias al hombre son la secrecion del semen, la conduccion de éste á las vesiculas por los vasos aferentes, la retencion en las vesiculas, y la jaculacion.

El semen se segrega en los *testiculos* dos glándulas ovoídeas situadas comunmente fuera del vientre, dentro del escroto, y sostenidos por tres túnicas propias la *albuginea*, *baginal*, y *periteste*. La sangre de que se segrega el semen es conducida á estos órganos por las arterias espermaticas.

El semen es un humor blanquecino, de consistencia mediocre que se compone de dos substancias una liquida dicha espermatica de un olor fuerte y especifico; su sabor salado y un poco acre. La consistencia y olor fuerte del esperma son mas pronunciados en razon á que los hombres son mas robustos. La otra parte es el aura seminal, es á quien principalmente se atribuye la virtud fecundante; esta no ha podido ser analizada; bien que en todos casos el analisis del semen es inecsacto; á mas de que el semen siempre sale unido con el humor prostático y uretral. La secrecion del semen empieza en la época de la pubertad; y tiene grande influencia como queda dicho sobre la economia animal.

El semen segregado se combina y modifica al traves de las tortuosidades del epidídimo: es conducido, y en algun modo tambien modificado, por los vasos aferentes á las vesículas seminales en donde se retiene hasta que

por estímulos mecánicos de irradiación y principalmente, por la sensación instintiva venerea se contraen, y apretando el semen le obliga á salir por los vasos jaculatorios que se abren en la uretra cerca del verumontano: sin que pueda volver atrás á los vasos afarentes porque se lo estorba la posición oblicua con que entran estos conductos á las vesículas, la cual disposición hace que queden cerrados sus orificios al tiempo que ellas se contraen.

El semen llegado á la uretra es espelido afuera por la propia acción de este conducto; siendo para ello necesaria cierta disposición vital particular opuesta á la disposición nativa, de modo que cuando es susceptible de rehacerse para el semen no lo es para la orina y *vice versa*. Para que el semen pueda salir debidamente conviene que el tejido esponjoso del pene sea distendido á todas direcciones, esto es que el pene esté en *erección*. Los fenómenos locales de la erección del viril, tal como la mayor dureza, mayor longitud, llenura de sangre en sus células, y el aumento de calor son debidos á la influencia nerviosa, sin que pueda decirse otra cosa.

En el momento de la expulsión experimenta el hombre fenómenos generales de convulsión, obtusión, sacudimientos etc. semejantes á los que produce una conmoción eléctrica. Después de jaculado se siente con postración general y debilidad en sus articulaciones también semejante al efecto consecutivo de electrificación, al paso que antes y mientras escitado del instinto se hallaba furioso enardecido y ágil en sus ejercicios siempre dirigidos al objeto instintivo.

Funciones femeninas.

El aparato femenino es compuesto de los ovarios, las tuvas de falopio, el útero, y la vagina.

Los órganos generativos y principalmente el útero parecen constituirse de un tejido cuya estructura y propiedades forman un género particular en la economía animal, que constituye un centro sensitivo de instintos y pasiones, agente de las modificaciones mas esenciales de la muger. Los ovarios órganos secretorios de un material que contienen aislado, su forma y analogía no dejan duda de ser receptáculos de pequeños huevos, como son las vejiguillas contenidas en su tejido. Las tubas falopianas de cavidad continua con los ovarios á quienes abrazan con el *morsus diaboli*, son dotadas de una contractilidad y sensibilidad especial solo movibles por los estímulos de instinto venereo y por el producto de la concepcion. El útero órgano principal es quien mas goza de la facultad atraente como si su naturaleza fuese de los absorventes, es susceptible de un desarrollo extraño y en ninguna manera comparable con el de los demas órganos; es muy sensible é irritable, y el mas irradiante.

La vagina es dotada de una estensibilidad orgánica especial, es muy irritable principalmente en los estímulos venereos, y no poco en los mecánicos; abraza el cuello del útero por su parte posterior.

Menstruacion.

Al llegar las mugeres á la edad de pubertad es manifestada esta por una evacuacion sanguinea ó sanguinolenta que sale por la vagina procedente del útero en épocas determinadas que son por lo regular cada mes. Su duracion, asi como la cantidad, color, olor, y demas cualidades fisicas del humor que arrojan es muy variable. Ella persiste hasta la edad de cuarenta á cincuenta años sin faltar regularmente en estado de salud sino en el tiempo del embarazo y principio de la lactacion. Es una verdadera secrecion por exsalsacion capilar en que se espelen á su beneficio

sustancias cuya permanencia en el cuerpo de la muger le seria perjudicial; de modo que su supresion ó arresto produce unos fenómenos de trastorno semejantes á los de supresion de los demas humores escrementicios. En tanto que dura el período menstrual las mugeres son de susceptibilidad estremada, el menor ruido les incomoda, la menor contrariedad las afecta, son mas irascibles, y por fin un desórden en la fisionomia y en todas las funciones fisicas y morales demuestran sensiblemente la ecsistencia en esta época determinada. La menstruacion es la mas susceptible de aberrar de sitio habiéndose visto fluir por casi todas las partes del cuerpo como por la nariz, boca, ojos, uñas, pezones etc. Es creible que con esta evacuacion se descarta la muger de los materiales que al tiempo de la gestacion son empleados para la formacion de algunas partes del feto: por ella finalmente se preserva la muger de ciertas enfermedades muy comunes á los hombres como la gota; y su cesacion regular la dispone á otras de vicio específico y sobre todo al canceroso.

Copulacion y fecundacion.

Mediante un sentimiento instintivo vienen en union el macho y la hembra; sin embargo en el hombre parece ser en algun modo educado, pero como sea, el pene viene en ereccion, procura el hombre su introduccion hasta que irridiando el estimulo á las vesiculas y testiculos estos segregan mas, y aquellas contraiéndose espelen el semen, por medio del pene erizado, en la vagina.

Hasta aqui lo que sabemos, todo lo demas es misterioso y jamas apeable. Contentémonos en lo mas probable por analogia. Es creible que el semen viril depositado en la vagina, ya sea absorbido todo ó *Fecundacion.*

en parte por el utero y tubas falopianas hasta los ovarios, ó ya sea por los absorbentes conducido, viene á parar á los ovarios para fecundar el huevo que se halle dispuesto, pero sin que nos sea licito remontarnos al conocimiento de lo que sea esta funcion; ello es que el huevo baja por la tuba al utero en donde se retiene para la gestacion; tampoco sabemos el tiempo que emplea para bajar por la tuba, ni el que tarda en desprenderse del ovario, ni por fin si la fecundacion es en el mismo acto del coito. Todos los experimentos sobre el particular son mas curiosos que útiles.

Preñez ó gestacion.

El tiempo que persiste lo fecundado dentro el vientre de la muger es por lo regular nueve meses. El desarrollo del huevo es comunmente en el utero, pues es muy raro en la tuba, en el ovario, y en el vientre fuera de los órganos genitales.

*Cambio del
utero en la
preñez,*

En los tres primeros meses del embarazo el desarrollo del utero es poco considerable, pero á mediados del cuarto crece mas rapidamente hasta que á los ocho meses llena casi todas las regiones hipogástrica y umbilical, comprime y desaloja los órganos circumvecinos. Pasados los ocho meses el fondo se abaja y se acerca al ombligo. En los siete primeros conserva su figura conoidea, pero pasado este tiempo la adquiere ovoidea porque disminuyendo el cuello y remontándose forma un plano igual con su cuerpo. El fondo del utero es tirado hacia delante, siendo esta mutacion ventajosa para facilitar el libre curso de la sangre por los grandes vasos. El tejido del utero pierde su consistencia y adquiere un color rojo mas oscuro y una disposicion esponjosa, y vuelve mas evidente su estructura fibrosa. En los cambios de volumen y estructura del utero las arterias

venas, y vasos linfáticos adquieren un volumen muy considerable siempre relativo al desarrollo uterino.

Mientras el utero se desarrolla la madre experimenta fenómenos dignos de atención. La menstruación desaparece, los pechos se abultan, si cria la leche vuelve serosa y algunas veces de mala condición; se le hinchan los parpados y toma un color aplomado; la vista se marchita, la transpiración adquiere un olor particular; se manifiesta una palidez general, aborrecen la comida, se deprava el gusto, vienen náuseas y vómitos sobre todo por la mañana, dolores vagos, el abdomen se pone sensible etc. Las funciones intelectuales se debilitan y se ponen muy irritables y tristes.

*Fenómenos
de la preñez.*

A estos accidentes generales se juntan otros locales de compresión efecto del mayor volumen del utero; tales como rama en los miembros inferiores; así como las venas de estos se ponen varicosas, se hinchan; y experimentan un sentimiento de hormigueo. En los últimos tiempos de la preñez se hallan comprimidos la vejiga y el recto de que nacen frecuentes ganas de orinar y hacer de cuerpo.

*Desarrollo
del huevo en
el utero*

Hasta el tercero mes el huevo contenido en el utero ofrece conocimientos poco importantes, su vida parece ser por mera absorción que se verifica en todas las partes de su superficie exterior; pero al llegar en esta época se halla ya formada la placenta por cuyo medio se nutre el feto, crece y se desarrolla hasta al fin de la preñez. Su estructura experimenta cambios sensibles adquiriendo mayor espesura y resistencia á medida que va creciendo. Entre las membranas *chorion* y *amnion*, y el feto se encuentra un líquido que aumenta á proporción que crece el huevo: este líquido es formado de agua, albumina, sosa, muriate de sosa, y fosfate de cal.

A principios del segundo mes es sensible la distribución de las partes en el embrión principalmente la cabeza y sus órganos esternos, y cerca los cuatro meses es verificado el desarrollo en todas sus partes; entonces cesa el estado de embrión y empieza el de feto que continua hasta el parto. Durante este tiempo todas las partes así interiores como esternas crecen y se acercan con mas ó menos rapidez á la disposición mas perfecta; á fines del séptimo mes se hallan vividores ó en aptitud de recibir las impresiones exteriores, aptitud que se perfecciona gradualmente hasta el nacimiento.

*Funciones
del huevo y
del feto.*

Hasta que el concepto llega á la época de feto, todas sus funciones se limitan á la absorción de modo que sus órganos de poco sirven para su propia existencia; sin embargo á mediados del segundo mes ya son bosquejados todos sus aparatos. Empiezan á hacerse manifestas las funciones del tercero al cuarto mes, pero hasta el quinto no son perceptibles las secreciones.

No obstante que el feto no digiere se encuentra en su estómago una cantidad de materia viscosa que puede considerarse como la reunión de los humores gastricos: en el intestino duodeno se encuentra el *meconio* materia negra que no es mas que los mismos jugos del estómago e intestino duodeno en union con la bilis y suco pancreático elaborados imperfectamente, formando sin embargo una quilificación particular, pues sus absorbentes lácteos se encuentran llenos tambien de un quilo imperfecto.

Parece cierto que si las secreciones en el feto son imperfectas á lo menos son abundantes las exhalaciones y secreciones mucosas, siendo creible que la capa espesa de materia grasienta que cubre la superficie del feto es de la secreción folicular.

El calor animal del feto es algunos grados menor que el del nacido. Entre todas las funciones del feto ninguna hay mas conocida y complicada que la circulacion. Apenas es posible hallar diferencia entre su sangre venosa y arterial, una y otra presenta un color rojo oscuro, que como la del adulto se separa en dos partes suero y coagulo.

*Circulacion
del feto.*

La opinion mas comun es que el feto se nutre de la sangre que le presta la madre por medio de las arterias uterinas que la filtran, y depositada en las celulas de la placenta uterina es absorbida por las ramificaciones de la parte vascular ó fetal, las cuales reuniéndose forman al salir de la placenta un solo vaso llamado vena umbilical, el cual enroscado con otros dos vasos, *las arterias omblicales*, que procedentes del feto van á perderse á la placenta, forma el cordon umbilical. La vena umbilical penetra por el ombligo del feto dentro del vientre, y viene hasta la cara interna del hígado en donde se divide en dos troncos de los cuales uno se distribuye en esta entraña junto con la vena porta y el otro termina en la vena cava por medio del canal venoso: asi la sangre que se vierte en esta vena como la que va al hígado, entra por las venas cavas en la auricula derecha del corazon de donde parte pasa á la auricula izquierda por el agujero de Botal, y la otra pasa al ventrículo derecho de donde enfila al salir, la mayor parte á la arteria aorta por el canal arterioso, y una muy pequeña por las arterias pulmonales atraviesa los pulmones, pero sin sufrir alteracion alguna por el aire, pues el feto no respira. La cantidad de sangre por estas arterias debe ser poca porque el aplastamiento de los pulmones no permite dilatarse sus vasos. La que atraviesa á los pulmones es conducida por las venas pulmonales á la auricula izquierda del corazon de donde pasa al ventrículo izquierdo para

enfiar la arteria aorta en cuyo lugar se halla replegada toda la sangre que entraron al corazon las venas cavas. Desde esta parte se efectua la circulacion en el feto por las arterias como en el adulto con sola la diferencia que una parte de la sangre vuelve desde las iliacas por las arterias ombilicales á la placenta: no pudiéndose creer que esta sangre sea el residuo de la nutricion que como creen algunos vuelve á la placenta paraque absorviéndola la madre la prepare de nuevo; antes bien es mas verosimil que estas dos arterias conduzcan una parte de sangre escedente del feto, cuyo esceso á no ser asi produciria su ruina. A la verdad residuo de la nutricion no puede serlo porque nace del manantial comun de donde se nutren todas sus partes.

*Relaciones
de la madre
con el feto.*

El feto se halla necesariamente ligado con la madre por la materia nutritiva que esta le presta de modo que si es de buena calidad y en cantidad suficiente su crecimiento es de un modo satisfactorio; pero si la porcion es poca ó si las cualidades no son buenas el feto se nutre menos, cesa su desarrollo y al fin muere. Las afecciones morales de la madre capaces de trastornar sus funciones asimilativas transcienden al feto con una influencia apenas creible. Es por esto que un terror subito, una pasion de ira, una tristeza inmoderada ó una alegria ecseiva pueden causar la muerte del feto, ó retardar su crecimiento. En fin las afecciones fisicas como golpes, caidas, envenenamientos etc. pueden tener el mismo resultado.

Como el feto no respira y por lo mismo no puede preparar su sangre, sino que debe recibirla preparada de su madre, es evidente que debe resentirse de los trastornos en las funciones asimilativas de esta.

La sangre que el feto recibe de la madre parece variar de cualidades adquiriéndolas mas nutriti-

vas á medida que se acerca el nacimiento. No es fuera de propósito el creer al hígado como un órgano preparatorio de su sangre que le descarga del hidrógeno y carbon escedente, la misma propiedad que se considera tambien á su ecsalacion cutanea, y tal vez la capa grasienta que le cubre puede mirarse justamente como el conductor de ellos.

Si por lo comun se forma un feto en cada preñez *Preñez mul-* no es raro el verse dos ó tres, ni es increible lo *tiplicada.* que cuentan algunos de preñeses muy multiplicadas.

Tampoco es extraño verse un feto con dos cabezas, otros sin cabeza, otros con tres piernas etc. *Vicios de* pues los vicios de conformacion son siempre el efecto de *conformacion* causas desconocidas que han obrado contra el desarro- *y monstruo-* llo regular del feto; asi como las monstruosidades *ciudades.* dependen de la confusion de dos germenos ó huevos de una preñez doble ó triple que durante el estado mucoso de embrion se han aplastado, aderido y confundido los órganos de unos con otros.

Del parto.

Se dá el nombre de aborto cuando sale el feto antes de los seis meses de embarazo; llaman prematuro al que viene desde los seis hasta mediados del noveno mes, en que el feto es ya vividor; toma la denominacion de parto con propiedad cuando acontece á los nueve; y por fin parto tardío llaman al que se prolonga mas allá de esta época.

Sin embargo que en el modo como naturalmente se terminan los partos hay mucha variedad respecto á la duracion, resistencias, y sufrimientos, con todo en todas hay cierta uniformidad que demuestra la identidad de la funcion.

Las causas físicas que determinan la salida *Causas.* del feto son la contraccion del utero ayudada de

la de los músculos abdominales y diafragma; á su beneficio se arrojan las aguas del amnion, la cabeza del feto se encaja en la entrada de la pelvis, corre la escavacion de esta, y sale por la bulva; pero estos fenomenos son sucesivos y duran mas ó menos tiempo. Son acompañados de dolores mas ó menos vivos de hinchazon en las partes externas de la generacion, y de aumento de secrecion mucosa local. Para bien facilitar el estudio de este acto lo divide Magendie en cinco ttempos como sigue.

Primer periodo. Es formado de señales precursoras. Dos ó tres dias antes del parto viene un corrimiento mucoso por la vagina, se hinchan y vuelven mas molles las partes genitales externas y los ligamentos que unen los huesos del vacinete; el cuello del utero se aplasta, su abertura se engrandece, se adelgazan sus ~~bordes~~ bordes, y se sienten ligeros dolores en los lomos y abdomen conocidos con el nombre de *moscas*.

Segundo periodo. Se desarrollan dolores de un genio particular que vienen por intervalos bastante largos como de un cuarto á media hora, empezando en los lomos y estendiéndose hasta el cuello del utero y su fondo. Cada uno de ellos acompañado de una contraccion evidente del cuerpo del utero, y de una tension manifesta de su cuello con dilatacion de su abertura; el dedo entrando en la vagina manifesta que los embultorios del feto van saliendo cada vez mas formando una bolsa fluctuante llamada *bolsa de las aguas*: á poco tiempo los dolores vienen mas fuertes, y mas energicas las contracciones del utero; la bolsa se rompe y se derrama una parte del liquido; el utero se contrae y se aplica á la superficie del feto.

Tercer periodo. Los dolores y las contracciones del utero adquieren un incremento considerable, y

son instintivamente acompañados de la contraccion de los músculos abdominales. La muger entónces conociendo su eficacia procura favorecerlas empleando todos los esfuerzos musculares de que es capaz: entónces el pulso viene mas elevado y mas frecuente, su figura se anima, se ponen brillantes sus ojos, se allá todo el cuerpo en una agitacion estremada y chorrea el sudor en abundancia. La cabeza se encaja en el bacinete, colocado el occipucio debajo la cavidad cotiloidea izquierda, es tirado á dentro y abajo para colocarse detras y abajo del arco del pubis.

Cuarto periodo. Despues de algunos instantes de reposo los dolores y las contracciones espulsivas adquieren de nuevo toda su actividad; la cabeza se presenta á la bulva, hace esfuerzos para pasar y lo consigue cuando llega una contraccion bastante fuerte para ello. Desencajada la cabeza sale facilmente el resto del cuerpo por ser menor su volumen. Se practica entónces la seccion del cordón umbilical y se hace la ligadura á poca distancia del ombligo.

Quinto periodo. Si la placenta no sale con el feto, despues de algun tiempo renacen pequeños dolores, el utero se contrae aunque debilmente, pero con bastante fuerza para arrojar las *palias*: á esta espulsion se dá el nombre de *conclusion* del parto. Durante los doce ó quince primeros dias despues del parto el utero poco á poco se encoge, la muger experimenta sudores abundantes, los pechos se abultan por la leche que segregan, y los *loquios*, humor sanguinolento acoso que sale por la vagina, indican que los órganos de la muger van restituyéndose poco á poco á la disposicion que tenian antes de la concepcion.

Luego que el infante es separado de la madre y algunas veces antes dilata el pecho, y atrae el

aire dentro de los pulmones los cuales se distienden gradualmente á medida que repiten las inspiraciones: desde este momento queda establecida la respiracion para toda la vida. La distencion de los pulmones por el aire aumenta el paso á la sangre por la arteria pulmonar y pasa menos por el canal arterial, el cual se estrecha poco á poco, asi como el augero de Botal hasta que al fin se obliteran. El mismo fenomeno sucede con las venas y arterias umbilicales.

El recién nacido tiene por lo regular de diez y ocho à veinte pulgadas de largo, y su peso es de cinco á seis libras. En general el número de machos es superior al de las hembras.

De la lactacion.

No se limita la obligacion de la madre para con su hijo en retenerle y nutrirle dentro sus entrañas, si que despues de haber desempeñado el acto doloroso de que acabamos de hablar para darle á luz, entra en las nuevas obligaciones de garantizarle de las impresiones del aire y de las estaciones; de procurar su conservacion y educacion fisica y moral; y por fin de proporcionarle el primer alimento, el solo que está dispuesto para el, en razon á la tierna organizacion de que goza.

Este alimento es la *leche* humor blanco dulce cuyas propiedades fisicas siendo específicas son bien conocidas de todos. Se segrega en los *pechos* parenquima esponjoso de naturaleza en apariencia linfática muy distinto del de los demas órganos secretorios. Las arterias que se distribuyen en ellos al paso que muy numerosas son muy pequeñas; los linfáticos y nervios son muy abundantes. Del parenquima nacen doce ú quince canales que terminan en el pezon. La dispo-

sicion del pezon es particular, sus propiedades son mucha elasticidad y encogimiento vital; son asimismo bastante irritables, y los estímulos mecánicos suaves trascienden con facilidad al parenquima del pecho, por esto la succion provoca las *avenidas* de la leche, y al contrario se retrae facilmente cuando el infante está mucho tiempo sin mamar. Las funciones de los pechos simpatizan en gran manera con las del utero, de modo que las escitaciones de ambos se comunican mutuamente; los estímulos del utero sobre todo de la fecundacion alteran, pervierten y aun suspenden del todo la secrecion de la leche; asi como los estímulos continuos de la secrecion de esta se oponen à otra nueva fecundacion.

Es en la secrecion de la leche sobre la que tiene mas poderio el sistema nervioso. Las pasiones se transmiten con rapidez à los pechos de cria pervirtiendo la leche instantaneamente y volviendola nociva para los infantes; por esta razon no conviene que el ama dé el pecho al infante luego despues de una pasion cualesquiera, antes conviene aguardar à que sea reintegrado el sistema nervioso, y vaciar los pechos de la leche, contenida durante la pasion, antes de darla al infante.

Se cree con fundamento que la secrecion de la leche es principalmente por el sistema linfático, pero gozando este en los pechos una disposicion particular de propiedades; sin embargo es verosimil que la fuerza nerviosa influye mucho, y que la sangre arterial deposita por ecsalacion un humor seroso que unido y elaborado con los materiales linfáticos en el parenquima de las mamas forman la leche pero de un modo particular hasta ahora incomprensible.

La primera leche que sale de los pechos es serosa al parecer de naturaleza ligeramente purgante muy apropósito para que el infante evacúe el meco-

nio ; por esta razon conviene que se dé al recien nacido , resultando ser perjudicial el que otra le dé de mamar ; pues la naturaleza que no descuyda á si misma ha sabido proporcionar todas las ventajas: el *colostron* (que asi se llama este humor seroso) útil á los tres ó cuatro primeros dias los suficientes para que el infante se limpie , es reemplazadó por una leche clara parecida al suero, relativa á la poca fuerza del niño , y su consistencia y cualidades nutritivas van sucesivamente aumentando á medida que crece el infante y son sus fuerzas mas resistentes. La leche contiene *suero*, *queso*, y *manteca*: al principio de la lactacion abunda la primera , y las segundas aumentan sucesivamente hasta que á los dos años (época comun de la duracion de la leche) es muy espesa por abundar mucho de estas dos sustancias.

La cantidad y naturaleza de la leche cambian con la cantidad y naturaleza de los alimentos ; sus propiedades varian en razon á las condiciones de las sustancias ingeridas en el estómago ; asi como la sola introduccion de algun alimento basta para determinar repentinamente mayor cantidad de leche en los pechos , prueba de la mucha simpatía entre estos órganos y el estómago. Si el alimento es muy nutritivo la leche es mas espesa y al contrario, hay ciertas sustancias contrarias á la leche y cuyo uso la suprime, *los ácidos*. La idiosincrasia es la principal circunstancia á que debe atenderse para el uso y proscripcion de ciertos alimentos en las mugeres que crian , si v. g. al uso dé alguno tenido por bueno y nutritivo se pervierte ó retrae la leche debe proscribirse ; y al contrario si al uso de otro creido de mala condicion se comporta bien el infante y el ama debe tolerarse ; con todo si sus condiciones son temibles para la sucesivo debe advertirseles para que lo suspendan cuando combenga. Tambien se impreg-

na la leche de las cualidades de los medicamentos; es purgante por egemplo si la muger ha tomado la jalapa; es tónica si ha tomado la quina &c. La facilidad de impregnarse la leche de las virtudes medicamentosas que toma la madre, proporciona la curacion de las enfermedades venéreas en los recién nacidos, tomando el ama los remedios.

Aunque la secrecion de la leche parece ser esclusiva á la muger parida, con todo algunas veces se han visto vírgenes, y aun hombres con esta propiedad.

FIN.

T A B L A.

| | |
|--|---------|
| Elementos de fisiología | Pág. 1. |
| Definicion. Division. | |
| Preliminares. | id. |
| De los cuerpos y sus divisiones. Cuerpos ponderables. Imponderables. Propiedades generales de los cuerpos. Propiedades secundarias. Estados de los cuerpos. Cambio de estado. Composicion de los cuerpos. Simples. Compuestos. | |
| Tabla de las diferencias entre cuerpos organizados é inorgánicos | 3. |
| Los cuerpos vivos se dividen en vegetales y animales. | 4. |
| Elementos que entran en la composicion de los animales. | id. |
| Principios ó materiales inmediatos de los animales. Elementos orgánicos. Tejidos. Que son órgano y aparato. Propriedades del Tejido. Propriedades químicas. Propriedades animales. | |
| De los fluidos ó humores. | 7. |
| Fluidos humanos. | |
| Causas de los fenómenos propios de los cuerpos vivos. | 8. |
| Principio vital. Propriedades vitales | |
| Fenómenos de la vida de los fluidos | 10. |
| Fenómenos vitales. | |
| Resultados del organismo. | 11. |
| De la vida. | 12. |
| Vida orgánica. Vida animal. | |
| Simpatías | 13. |
| Division. Particulares. Movimientos de concen- | |

| | |
|--|-----|
| <i>tracion y expansion. Salud. Por la edad. Estacion. Simpatias por mitad del cuerpo.</i> | |
| Hábito. | 17. |
| <i>En que consiste. Éfecto principal del hábito Inconstancia. Poder del hábito. Influxo del mismo. Embota la sensibilidad, y perfecciona el juicio.</i> | |
| De las circunstancias individuales. | 18. |
| <i>Edad. Division. Infancia. Denticion. Osificacion. Pubertad. Se desarrolla el sexo; señal característica de la puertad. Edad viril. Edad de decremento. Edad decrepita. Muerte natural. Epoca de la muerte. Probabilidadese de la vida humana.</i> | |
| Secso. | 24. |
| <i>Secso masculino.</i> | |
| Temperamentos. | 25. |
| <i>Definicion.</i> | |
| Género de vida. | 32. |
| Circunstancias generales y locales que influyen para la vida del hombre. | 33. |
| Funciones. | id. |
| Funciones de relacion. | 34. |
| <i>Sentidos. Vista.</i> | |
| Aparato de la vision | 36. |
| <i>Humor sebaceo de meybomio.</i> | |
| Aparato lagrimal. | 37. |
| Globo del ojo y nervio óptico. | 38. |
| Mecanismo de la vision | 39. |
| Oido, | 41. |
| Mecanismo del oido. | 41. |
| <i>Accion de los dos aparatos. Modificaciones por la edad.</i> | |
| Olfato. | 44. |
| <i>Veiculo de los olores. Sensivilidad de la pituitaria. Modificaciones del olfato por la edad.</i> | |

| | |
|---|-----|
| Gusto. | 46. |
| <i>Sabores y su division. Aparato del gusto. Modificaciones por la edad.</i> | |
| Tacto. | 47. |
| <i>Se distingue el tacto de tocar. Aparato. Mecanismo del tacto. Mecanismo del tacar. Modificaciones por la edad.</i> | |
| Sentidos internos. | 49. |
| <i>Se pueden aumentar las sensaciones voluntariamente. Se pueden disminuir. Los sentidos se influyen mutuamente.</i> | |
| De las funciones del cerebro. | 53. |
| <i>Inteligencia.</i> | |
| De la sensibilidad. | 54. |
| De la memoria. | 55. |
| Del juicio. | id. |
| Del deseo ó de la voluntad. | id. |
| Del instinto y de las pasiones. | 56. |
| De la voz y movimientos. | 58. |
| <i>Aparato del movimiento</i> | |
| Músculos. | 59. |
| <i>Mecanismo. Modificaciones de la contractilidad muscular por la edad,</i> | |
| De la influencia nerviosa en el movimiento muscular. | 63. |
| Sistema oseo. | 64. |
| <i>Parte fundamental del esqueleto. Tamaño y figura de los huesos. Uso del periostio. Uso de la médula.</i> | |
| Articulaciones. | 65. |
| Principios de mecánica necesarios para la inteligencia de los movimientos y posturas. | 66. |
| <i>Línea vertical. Centro de gravedad. Equilibrio. Base de sustentacion. Resistencia de las columnas. Palancas. Brazo de la palanca. Inser-</i> | |

cion de las pujauzas en las palancas. Fuerza motriz. Causas que influyen para el movimiento. Roze y adesion.

Fuerza de los músculos ; ventajas y menoscabos que experimenta en el movimiento voluntario. 70.

Menoscabos. Ventajas.

Corolario. 73.

De la voz. 74.

Mecanismo. id.

De la intensidad de la voz. Timbre. Tonos de la voz. Grito. Voz adquirida. De la palabra. Mecanismo de las palabras. Letras. Vocales. Labiales. Independientes de la voz. Pronunciacion. Voz baja. Palabra. Canto Mudez. Tartamudez. Gastrimismo ó ventrílocos. Modificaciones por la edad. Gritos del recién nacido.

Sueño y vigilia. 79.

Duracioa. Causas que hacen conciliar el sueño. Causas que lo interrumpen. Sueño. Somnambulismo.

De las funciones asimilativas. 82.

Funciones digestivas. 83.

Alimentos y bebidas id.

Del hambre y de la sed. 85.

Preparacion de los alimentos en la boca. id.

Mecanismo. Disolucion salival. Saliva. Utilidades. Deglucion.

Digestion estomacal. 89.

Fenómenos Mecánicos. Fenomenos iuternos. Sinergia digestiva. Quimo. Quimificacion. Humores del estómago. Usos del píloro. Sensaciones internas que acompañan á la quimificacacion.

Digestion duodenal. 94.

Cambio que experimenta el quimo en los intestinos delgados. Accion de los intestinos gruesos.

| | |
|---|------|
| <i>Escrecion de las heces. Modificaciones de la digestion.</i> | |
| Absorcion y curso del quilo. | 99. |
| <i>Mecanismo de la absorcion. Linfa. Quilo y su curso.</i> | |
| Aparato venoso. | 103. |
| Circulacion. | 105. |
| Respiracion. | 107. |
| Sanguificacion. | 109. |
| Aparato de la sangre arterial | 110. |
| <i>Causas que retardan el curso de la sangre arterial. Causa que favorece la progresion.</i> | |
| <i>Otra. Terminacion de las artérias.</i> | |
| Secreciones. | 114. |
| <i>Ecsalaciones. Secrecion folicular. Secrecion glandular.</i> | |
| Secreciones en particular. | 117. |
| Secrecion de la bilis. | 118. |
| Secrecion de la orina. | 119. |
| <i>Orina de bebida. Orina de quilo. Exposicion.</i> | |
| De la transpiracion cutánea. | 122. |
| <i>Concursos de causas para la transpiracion.</i> | |
| <i>La transpiracion y el sudor debilitan.</i> | |
| De las secreciones accidentales. | 123. |
| De la nutricion. | 124. |
| Del calor animal. | 126. |
| <i>1.^a Cuestion. Origen del calor animal. Origen del calor animal en los pulmones. Origen del calor animal en todo el cuerpo. 2.^a Cuestion.</i> | |
| <i>3.^a Cuestion.</i> | |
| Funciones secсуales. | 130. |
| Funciones femeninas. | 132. |
| <i>Menstruacion.</i> | |
| Copulacion y fecundacion. | 133. |
| <i>Fecundacion.</i> | |

| | |
|---|------|
| Preñez ó gestacion. | 134. |
| <i>Cambios del utero en la preñez. Desarrollo del huevo en el utero. Funciones del feto ó del huevo.</i> | |
| <i>Circulacion del feto. Relaciones de la madre con el feto. Preñez multiplicada. Vicios de conformacion y monstruosidades.</i> | |
| Del parto. | 139. |
| <i>Causas. Períodos.</i> | |
| De la lactacion. | 142. |

